DTU

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri
Fødevarestyrelsen

# Pesticidrester i fødevarer 2020

## Resultater fra den danske pesticidkontrol

# Pesticidrester i fødevarer 2020

# Resultater fra den danske pesticidkontrol

Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2022
Forfattere:
DTU Fødevareinstituttet: Bodil Hamborg Jensen, Pernille Bjørn Petersen, Elena Hakme, Mette Erecius Poulsen
Fødevarestyrelsen: Helle Lindberg Madsen, Nina Nørgaard Sørensen, Gudrun Hilbert og Annette Grossmann

© Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf.: 7227 6900

ISBN 978-87-93147-46-1

Publikationsnummer 2021005

Undersøgelserne er udført af Fødevarestyrelsens laboratorium:

Søren Johannesen,
Kirsten Halkjær Lund
Line M. Printz

Laboranterne:
Susanne Berg
Kim Elm
Helle Randrup Mondrup
Wendy Nielsson
Irene Petersen
Josefine Anselmo Skydsgaard
Karin Sørensen
Daniel Tjener
Rolf Alexander Jønck Johansen
Elizabeth Ann Suhr

i samarbejde med:

| | |
|---|---|
| Mette Erecius Poulsen | DTU Fødevareinstituttet |
| Elena Hakme | DTU Fødevareinstituttet |

Risikovurdering af overskridelser og multiple fund er foretaget af

| | |
|---|---|
| Bodil Hamborg Jensen | DTU Fødevareinstituttet |
| Annette Petersen | DTU Fødevareinstituttet |
| Elsa Nielsen | DTU Fødevareinstituttet |

Databehandling er udført af

| | |
|---|---|
| Pernille Bjørn Petersen | DTU Fødevareinstituttet |

Billedet fra en prøveudtagning på side 29 er taget af fotograf Nerman Dizdarevic.

## Indholdsfortegnelse

Pesticidrester i fødevarer 2020 ..... 1
1 Sammenfatning ..... 4
2 Indledning ..... 6
3 Undersøgelser af pesticid-rester 2020 ..... 8
4 Resultater ..... 10
4.1 Regler og kontrol ..... 10
4.2 Resultater af stikprøver ..... 11
4.2.1 Frugt ..... 12
4.2.2 Grøntsager ..... 13
4.2.3 Korn, ris og majs (cerealier) ..... 14
4.2.4 Anpriste kornprøver (stråforkortere) ..... 14
4.2.5 Animalske produkter inkl. forarbejdede og økologiske ..... 14
4.2.6 Forarbejdede vegetabilske produkter (inkl. økologisk) ..... 14
4.2.7 Babymad (inkl. økologisk) ..... 15
4.2.8 Chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl ..... 15
4.3 Resultater af mistankeprøver ..... 16
4.3.1 National mistankekontrol ..... 16
4.3.1.1 Målrettede prøver, herunder direkte import ..... 16
4.3.1.2 Kontrol med importører – Kampagne ..... 16
4.3.2 EU-koordineret mistankekontrol, forordning 2019/1793 ..... 16
4.4 Vurdering af fund i stikprøver og mistankeprøver ..... 16
5 Økologiske fødevarer ..... 18
5.1 Regler og kontrol ..... 18
5.2 Resultater for stikprøver af økologiske vegetabilske varer ..... 18
5.3 Kontrol af import af økologiske produkter fra Ukraine, Kazakhstan og Rusland m.fl. (mistankeprøver) ..... 18
6 Fokusafgrøder ..... 19
7 Fund og overskridelser i frugt, grøntsager og cerealier ..... 23
8 Påvisninger pr. prøve ..... 27
9 Pesticid-screening ..... 30
10 Konklusion ..... 31
11 Referencer ..... 32
Bilag 1.1 ..... 33
Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder ..... 33
Bilag 1.2 ..... 43
Pesticider inkluderet i screeningsanalyser ..... 43
Bilag 2 ..... 50
Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2020 ..... 50

Bilag 2.1 Konventionelt og økologisk dyrket frugt, grøntsager, cerealier, forarbejdede fødevarer, animalske produkter og babymad (stikprøver) ..... 50
Bilag 2.2 National mistankekontrol. Import af prøver udtaget i lufthavnen og prøver udtaget af rejseholdet (Målrettet prøvetagning) ..... 77
Bilag 2.3 Kontrol af import af økologiske produkter fra Ukraine, Kazakhstan og Rusland m.fl. (EU-koordineret kontrol) ..... 80
Bilag 2.4 Kontrolkampagne 2020 ..... 81
Bilag 2.5 EU-koordineret mistankekontrol, forordning 2019/1793 ..... 84
Bilag 3 ..... 85
Påviste pesticider i kontrollen, 2020 ..... 85
Bilag 4 ..... 100
Påviste overtrædelser, 2020 ..... 100
Bilag 5 ..... 104
Fund af flere pesticider i samme prøve, 2020 ..... 104
Bilag 6 ..... 105
Definitioner ..... 105

# 1 Sammenfatning

På baggrund af resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2020 konkluderer Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler.

Kontrollen omfattede i 2020 i alt 1751 prøver analyseret for indhold af pesticidrester. Kontrolprogrammet omfatter både stikprøver og mistankeprøver. Prøverne var fordelt på 225 forskellige typer fødevarer. Stikprøverne tilstræbes udtaget repræsentativt for det danske marked, mens mistankeprøverne udtages, hvor der der er mistanke om en væsentlig større hyppighed af overskridelser. Mistankeprøverne kan derfor ikke bruges til sammenligninger.

For stikprøverne holdes antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en vis sammenligning mellem årene. Det skal dog bemærkes, at der kan være forskelle fra år til år, der ikke nødvendigvis er tegn på en udvikling over tid. Forskelle kan f.eks. skyldes variationer i oprindelsesland og forskelle i prøvetyper - eller at behovet for behandling med pesticider kan være forskellig fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres, og at analysemetoderne løbende udvides med flere pesticider.

I stikprøvekontrollen blev der udtaget 448 prøver af konventionel frugt, 449 prøver af konventionelle grøntsager, 129 prøver af konventionelle cerealier, 100 prøver af økologisk frugt og grøntsager, 40 prøver af økologiske cerealier, 3 prøver af babymad inkl. økologisk, 79 prøver af forarbejdede vegetabilske fødevarer (tørret abrikos, figen, jordbær og æble, vin, sveske, melonkerner, kogt bulgur, cornflakes og tørret pasta) og 286 prøver af animalske fødevarer inkl. økologiske. I den nationale mistankekontrol blev der udtaget i 180 prøver, 26 prøver blev udtaget som specifik EU-mistankekontrol af økologiske fødevarer, og 11 prøver blev udtaget som skærpet importkontrol (EU-koordineret mistankekontrol, forordning 2019/1793).

I stikprøvekontrollen blev der fundet 8 prøver af frugt, 13 prøver af grøntsager og 2 prøver af cerealier med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til henholdsvis 1,8%, 2,9% og 1,6% af alle prøver af konventionelt dyrket frugt, grøntsager og cerealier. For 15 af de 23 prøver med indhold over maksimalgrænseværdien var overskridelserne signifikante (3 prøver af frugt, 10 prøver af grøntsager og 2 prøver af cerealier).

Der blev fundet pesticidrester i 81% af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og 47% af alle prøver af konventionelt dyrkede grøntsager samt i 37 % af konventionelt dyrkede cerealier. Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 98% af de undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, grøntsager og korn. Der blev, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i grøntsager. Andelen af dansk produceret frugt med pesticidrester er på niveau med frugt fra udlandet, mens der oftere findes pesticidrester i udenlandsk produceret grøntsager sammenlignet med grøntsager produceret i Danmark. Der ses således en stigning i andelen af dansk produceret frugt med pesticidrester i forhold til tidligere år. Det er dog usikkert om dette er en tendens, eller det skyldes, at det statiske grundlag er påvirket af, at der pga corona er udtaget færre danske prøver i 2020.

I forarbejdede konventionelle prøver blev der ikke fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien. Der blev ikke fundet pesticidrester i babymad. I animalske prøver blev der fundet indhold i tre prøver af honning. Indholdene var under maksimalgrænseværdien.

I de danske og udenlandske fokusafgrøder (gulerødder, jordbær, tomater, pærer, æbler

og hvede) har andelen af prøver med pesticidrester ligget på et nogenlunde stabilt niveau de seneste fem år. Der ses udsving mellem de enkelte år, men der er ikke grundlag for at konkludere markante tendenser i udviklingen. Dog ses, at andelen af prøver med restindhold er højere for fokusafgrøderne jordbær, pære og æble end de foregående år både for prøver fra Danmark og udlandet.

Der er en større andel af prøver med multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve) i prøver fra 3. lande og i prøver fra andre EU-lande sammenlignet med prøver fra Danmark.

Alle overskridelser af maksimalgrænseværdien er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD) og det accceptable daglige indtag (ADI). På den baggrund blev 25 prøver vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes. Af disse 25 prøver var 7 prøver udtaget som stikprøver: Ris (land ikke oplyst) (tricyclazol, buprofezin), chili fra Tyrkiet (buprofezin), peberfrugt fra Tyrkiet, (buprofezin), vindrue fra Egypten (chlorpyrifos), tørret bønne fra Madagaskar (chlorpyrifos), ærter med bælg fra Peru (carbendazim og benomyl) og ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl). 18 prøver var udtaget som mistankeprøver, herunder udtaget som led i pesticidkampagnen om egenkontrol: Sød basilikum fra Thailand (triazophos, carbendazim og benomyl), hellig basilikum fra Thailand (chlorpyrifos), svampe fra Vietnam (dimethoat og chlorpyrifos), aubergine fra Thailand (omethoat), selleriblade fra Thailand (omethoat, quentozen, chlorpyrifos, tecnazen), dild fra Thailand (carbofuran og chlorpyrifos), frisk koriander fra Thailand (chlorpyrifos), limeblade fra Thailand (chlorpyrifos), aubergine fra Tyrkiet (omethoat), aubergine fra et EU-land (land ikke oplyst) (omethoat og dimethoat), daddel fra Egypten (carbendazim og benomyl), pære fra Tyrkiet (diflubenzuron), sød basilikum fra Thailand (chlorpyrifos), ris fra Indien (tricyclazol), ris fra Indien (buprofezin, tricyclazol), ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl, tricyclazol), hvide ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl) og bukkehornsblade fra Indien (chlorpyrifos, tricyclazol).

Partier med en sundhedsmæssig risiko bliver trukket tilbage fra markedet, og der bliver udsendt Rapid Alert.

Ud over overskridelserne af MRL blev der påvist chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl i fem stikprøver. Fundene blev påvist i stikprøver af henholdsvis appelsin, banan, citron og to mandariner. En sundhedsmæssig risiko kunne ikke udelukkes på trods af, at MRL ikke var overskedet. Læs mere i afsnit 4.2.8 og se en oversigt i bilag 4.

Der blev udtaget 145 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer (inkl. forarbejdede). Der var påvisninger i syv af disse prøver: vindruer fra Egypten (spinosad), to prøver persille fra Italien (spinosad), salat fra Italien (azadirachtin og spinosad), tomat fra Spanien (spinosad), samt to prøver havregryn fra Tyskland (chlormequat-chlorid). Det blev vurderet for alle prøverne, at de var i overenstemmelse med varestandarden [1]. Varerne kunne derfor deklareres som værende økologisk.

Ud fra den nuværende viden vurderer Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, udgør en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. Indholdene af pesticidrester påvirker derfor ikke kostrådet om at indtage frugt og grønt.

# 2 Indledning

Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod f.eks. insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter forekommer i vores fødevarer. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (MRL), der er fastsat i lovgivningen.

MRL'er er fastsat i forordning 396/2005 om pesticidrester i fødevarer [2]. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. En MRL fastsættes ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at MRL'erne fastsættes ud fra, hvor højt et restindhold der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Der kan kun opnås en godkendelse, hvis dette restindhold ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der kan accepteres ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt.

Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg, fisk og honning for rester af pesticider. Der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Desuden skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens eksponering for pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står i samarbejde med Fødevarestyrelsen for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. Analyser udføres af Fødevarestyrelsens laboratorium.
Danmark indberetter resultaterne fra kontrollen til den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). EFSA udarbejder en rapport over resultater fra kontrollen i samtlige lande i EU [3].

Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grøntsager, så der undersøges flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund og overskridelser er størst. Desuden er prøveplanen for stikprøver bestemt ud fra hvilke fødevarer, der bidrager mest til danskernes eksponering for pesticidrester. Ifølge DTU Fødevareinstituttets beregninger [4, 5, 6] stammer mellem 85 og 97 % af danskernes pesticideksponering fra 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne udgøres af disse 25 hovedafgrøder. Derudover udtages også prøver til EU's kontrolprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder, men derimod om en mere risikobaseret kontrol. Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget som tilfældige stikprøver for, at de skal være repræsentative for det danske marked. Undtaget herfra er en mindre del af prøverne udtaget inden for områder, hvor der er mistanke om en væsentlig større hyppighed af overskridelser (mistankeprøver).

Siden 2006 er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en vis sammenligning af fund mellem årene. Det skal dog bemærkes, at der kan være variationer i oprindelsesland fra år til år. For de prøver, der ikke er hovedafgrøder, varierer prøvetyperne også fra år til år. Dette kan give forskelle, som ikke skyldes en udvikling over tid, men skyldes forskelle i prøveudtagningen mellem de enkelte år.

Pesticidindholdene i seks fokusafgrøder er sammenlignet over en 5-årsperiode. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. Der er flere forhold, som kan være medvirkende til variationer mellem årerne, herunder at behovet for behandling med pesticider kan være forskellig fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres, og at analysemetoderne løbende udvides med flere pesticider.

Ligeledes er fund og overskridelser for alle prøver af henholdsvis frugt, grøntsager og cerealier sammenlignet for den seneste 5-årsperiode. Her skal der tages hensyn til, at inden for hver gruppe af fødevarer varierer prøveplanernes fordeling af afgrøder fra år til år, og sammenligningen kan derfor også her kun ses som en grov retningsangivelse for udviklingen.

**Særligt for 2020**

Der blev foretaget justeringer i kontrollen som følge af corona-nedlukningen i foråret 2020 og december 2020. Antallet af planlagte prøver blev reduceret med 25 procent. Reduktionen af prøver var forholdsmæssigt større for danske prøver, da der erfaringsmæssigt er flere fund af pesticidrester i udenlandske prøver. Derudover blev en række metodeindkøringsopgaver udskudt.

# 3 Undersøgelser af pesticidrester 2020

Prøver til pesticidanalyser blev udtaget af Fødevarestyrelsens fødevareenheder. Prøveudtagningen fulgte EU's prøvetagnings-direktiv [7]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på Fødevarestyrelsens laboratorium. Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes på verdensplan, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. Det tilstræbes, at pesticidkontrollen bl.a omfatter stoffer, der indgår i EU's koordinerede program samt stoffer, som anvendes i Danmark. De fleste stoffer analyseres i multimetoder baseret på separation med gas- eller væskekromatografi samt massespektrometrisk identifikation og kvantificering. I bilag 1 er angivet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne.

Ud over stikprøvekontrollen blev der udtaget prøver til hhv. målrettede prøver, importkontrol af økologiske fødevarer, særlig kontrol af importører og skærpet importkontrol (forordning 2019/1793). Disse mistankeprøver omtales i afsnit 4.3 samt i Bilag 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5 og indgår ikke i de viste statistikker og tabeller over stikprøver.

**Prøver og analyser i 2020**

I 2020 blev 225 forskellige typer af fødevarer analyseret for pesticidrester fordelt på i alt 1751 prøver. Der blev analyseret for ca. 343 pesticider angivet som restdefinitioner. Derudover blev 115 prøver analyseret for yderligere 233 andre pesticider ved screeningsanalyser.

I **Tabel 1** ses antal prøver fordelt på de forskellige varetyper, hhv. konventionelle og økologiske.

**Kvartalsrapporter**

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet udgiver resultater fra pesticidkontrollen hvert kvartal. Kvartalsrapporterne kan du finde via dette link:

Pesticider i kosten - DTU Fødevareinstituttet

Ud over information om antal prøver, produktgrupper, grænseværdier og hvilke specifikke pesticider, der er påvist, kan man i kvartalsrapporterne også se, hvilke lande de udenlandske prøver kommer fra samt pesticidindhold i de enkelte prøver. For tidligere år er kvartalsrapporterne samlet for hele året.

**Tabel 1.** Antal analyserede prøver i stikprøvekontrollen samt mistankeprøver fordelt på fødevaretyper og oprindelse.

| Varetype | Konventionel eller økologisk | Dansk | Udenlandsk | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stikprøver** | | | | | |
| Frugt | Konventionel | 55 | 393 | 448 | 494 |
| | Økologisk | 3 | 43 | 46 | |
| Grøntsager | Konventionel | 142 | 307 | 449 | 503 |
| | Økologisk | 21 | 33 | 54 | |
| Cerealier | Konventionel | 63 | 66 | 129 | 169 |
| | Økologisk | 16 | 24 | 40 | |
| Babymad | Konventionel | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | Økologisk | | | | |
| Forarbejdede vegetabilske fødevarer | Konventionel | 4 | 70 | 74 | 79 |
| | Økologisk | 1 | 4 | 5 | |
| Animalske produkter | Konventionel | 211 | 70 | 281 | 286 |
| incl. forarbejdede produkter | Økologisk | 5 | 0 | 5 | |
| **Mistankeprøver** | | | | | |
| **National mistankekontrol** | | | | | |
| Målrettede prøver, incl direkte import | Konventionel | | 79 | 79 | 82 |
| | Økologisk | | 3 | 3 | |
| Egenkontrol med fokus på | Konventionel | | 89 | 89 | 98 |
| på pesticidrester - kampagne | Økologisk | | 9 | 9 | |
| **EU-koordineret mistankekontrol** | | | | | |
| Skærpet importkontrol (mistanke) | Konventionel | | 11 | 11 | 11 |
| Importtkontrol af økologiske Fødevarer (mistanke) | Økologisk | | 26 | 26 | 26 |
| **Sub total (dyrkningsform)** | Konventionel | 477 | 1086 | 1563 | |
| | Økologisk | 46 | 142 | 188 | |
| **Sub total (prøvetagningsstrategi)** | Stikprøve | 523 | 1011 | 1534 | |
| | Mistanke prøve | 0 | 217 | 217 | |
| **Total** | | 523 | 1228 | 1751 | 1751 |

# 4 Resultater

## 4.1 Regler og kontrol

Godkendelse af pesticider er i EU reguleret af forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1107/2009 [8], som i Danmark administreres af Miljøstyrelsen. Aktivstofferne vurderes på EU-niveau med hensyn til bl.a. miljø, sundhed og arbejdsmiljø og godkendes herefter enkeltvist ved optagelse på EU's positivliste. For stoffer, der er godkendt til brug i EU, kan der gives national godkendelse til en konkret anvendelse.

Maksimalgrænseværdier (MRL) for pesticidrester angiver den restmængde af et pesticid, der må være i en given fødevare – målt som mg pesticid pr kg fødevare. Fastsættelse af MRL for pesticidrester er i EU reguleret ved forordning 396/2005 [2]. Der findes MRL'er for alle pesticid-afgrøde-kombinationer, og disse kan ses i EU´s pesticid-database [9].

For de pesticid-afgrøde-kombinationer, hvor der ikke er en godkendt anvendelse af pesticidet, sættes MRL til den analytiske bestemmelsesgrænse (stjernemærket MRL; også kaldet detektionsgrænsen), normalt på 0,01* mg/kg.

Når der ansøges om godkendelse af et pesticid, angives betingelser for landmandens eller gartnerens anvendelse af pesticidet på en specifik afgrøde i form af en GAP (Good Agricultural Practice/god landbrugsmæssig praksis). GAP beskriver, hvordan pesticidet skal bruges, og angiver derfor dosis, behandlingshyppighed og tidspunktet for seneste behandling før høst (behandlingsfrist).

Ved anvendelse af GAP sigtes mod at opnå lige akkurat den ønskede virkning. Den anvendte mængde pesticid må hverken være for høj eller for lav, men skal være tilstrækkelig effektivt i forhold til bekæmpelse af eksempelvis ukrudt eller svampe. Restmængden af pesticidet i fødevaren vil herved blive den lavest mulige samtidig med, at anvendelsen af pesticidet er effektivt.

Når en MRL skal fastsættes, bestemmes først restindholdet af pesticidet i den modne afgrøde ved kontrollerede markforsøg, hvor afgrøden dyrkes ifølge GAP. Forslag til MRL beregnes på basis af markforsøgene. Herefter foretages der en sundhedsmæssig risikovurdering af forslaget til MRL i forhold til risikoen for kroniske og akutte effekter. Eksponeringen over længere tid (den kroniske eksponering) beregnes ud fra det samlede indtag af de afgrøder, hvor der er fastsat en MRL for det pågældende pesticid. Til beregning af eksponeringen bruges danske kostdata for det gennemsnitlige konsum af de forskellige fødevarer. Til vurdering af den kroniske eksponering sammenlignes den beregnede eksponering med ADI (Acceptabel Daglig Indtag) for pesticidet og angives i % af ADI.

Nogle pesticider har akutte effekter, og for disse er der fastsat en Akut Reference-Dosis (ARfD). Til vurdering af risikoen for akutte effekter beregnes eksponeringen over kort tid (24 timer). I beregningen bruges 97,5 percentilen for en enkelt dags konsum ("large portion") for den pågældende afgrøde og restindholdet i afgrøden. Den beregnede eksponering for pesticidet fra den pågældende afgrøde sammenlignes med ARfD for pesticidet og angives i % af ARfD.

Såfemt forslaget til en MRL ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko i forhold til både kroniske og akutte effekter, kan MRLen endeligt fastsættes. Hvis forslaget til MRL vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko, vil den søgte anvendelse ikke blive tilladt.

Det er den enkelte fødevarevirksomhed, der har ansvaret for, at de fastsatte MRL'er for pesticidrester overholdes, men Fødevarestyrelsen kontrollerer, om fødevarer på det danske marked overholder de fastsatte regler.

Kontrollen foregår dels ved at udtage prøver af frugt og grøntsager mv. til analyse, men også ved kontrol af fødevarevirksomhedens egenkontrol – eksempelvis virksomhedens dokumentation i form af analyseresultater. Ved den analytiske kontrol undersøges der både for godkendte og ikke-godkendte stoffer.

I de tilfælde, hvor en overskridelse af MRL er signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. analyseusikkerhed), kan Fødevarestyrelsen – ud fra en konkret vurdering – foretage sanktioner over for virksomheden.

Hvis MRL er overskredet, foretager DTU Fødevareinstituttet en sundhedsmæssig risikovurdering af det fundne indhold. Hvis ARfD overskrides, trækkes varen tilbage fra markedet og Fødevarestyrelsen indberetter fundet til det fælles europæiske overvågningssystem "Rapid Alert System for Food and Feed" (RASFF) [10]. RASFF skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne i EU.

## 4.2 Resultater af stikprøver

I dette afsnit gennemgås resultaterne for de forskellige typer af stikprøver. Det skal understreges, at arten af de undersøgte prøver kan være forskellige mellem de tre typer oprindelse (Danmark, øvrige EU-lande og lande uden for EU).

**Prøveudtagning**
Prøver til pesticidanalyse udtages af Fødevarestyrelsens fødevarenheder. Fødevareenhederne udfører akkrediteret prøvetagning – det betyder, at prøven udtages på en systematisk, ensartet og godkendt måde. Ca. 50 prøvetagere er akkrediteret til udtagning af prøver af fødevarer og foder til pesticidanalyse, og prøverne udtages i henhold til direktiv 2002/63/EF. Prøvetagerne indhenter oplysninger om prøverne i forbindelse med prøvetagningen, og disse oplysninger indtastes i Fødevarestyrelsens laboratoriedatasystem. På denne måde sikres sammenhæng mellem den udtagne prøve og det analysesvar, som virksomheden modtager. Prøverne udtages som regel på det lager, hvor grossistens, producentens eller importørens varer bliver opbevaret. Der udtages også prøver i lufthavne og havne af varer importeret fra tredjelande.

### 4.2.1 Frugt

I 2020 blev der udtaget i alt 448 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt dyrket frugt (friske og dybfrosne). I 1,8% af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskred MRL (se bilag 4). Der blev påvist pesticidrester i 81% af alle prøver af konventionelt dyrket frugt.

Fordelingen af antal prøver udtaget med oprindelse fra Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 1.

Der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 0%, 0,5% og 4% af prøverne for frugt produceret i DK, EU og uden for EU. Tilsvarende tal for tidligere år ses i figur 10.

Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund i dansk konventionelt produceret frugt 78%, mens andelen af prøver med fund i frugt produceret i EU hhv. uden for EU er 86% og 75%. Tilsvarende tal for tidligere år ses i figur 10.

Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2.1, mens resultater opgjort efter pesticid er vist i bilag 3.




**Figur 1**. **Frugt.** Pesticidindhold i stikprøver af frugt udtaget i 2020. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i intervallerne under 10% af maksimalgrænseværdierne (≤ 10% af MRL), mellem 10% og 50% af maksimalgrænseværdierne (10-50% af MRL), mellem 50% og 100% af maksimalgrænseværdierne (50-100% af MRL) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> MRL) i hhv. dansk frugt, frugt dyrket i øvrige EU-lande og frugt dyrket i lande uden for EU (eller af ukendt oprindelse).

### 4.2.2 Grøntsager

I 2020 blev der udtaget i alt 449 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt dyrkede grøntsager (friske og dybfrosne). I 2,9% af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskred MRL (se bilag 4). Andelen af prøver, hvor der kunne påvises pesticidrester var 47%.

Fordelingen af antal prøver udtaget med oprindelse fra Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 2.

Der blev fundet overskridelser af MRL i 0,7% af prøver fra Danmark, mens der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 0,5% og 12% af grøntsager produceret i EU og uden for EU. Tilsvarende tal for tidligere år ses i figur 11.

Som det ses af figur 2, er andelen af prøver med fund i danske konventionelt producerede grøntsager 25%, mens andelen af prøver med fund i grøntsager produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 60% og 50%. Tilsvarende tal for tidligere år ses i figur 11.

Af figur 2 fremgår det endvidere, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk producerede grøntsager end i dansk producerede grøntsager. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2.1, mens resultater opgjort efter pesticid er vist i bilag 3.




**Figur 2**. Pesticidindhold i stikprøver af grøntsager udtaget i 2020. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i intervallerne under 10% af maksimalgrænseværdierne (≤ 10% af MRL), mellem 10% og 50% af maksimalgrænseværdierne (10-50% af MRL), mellem 50% og 100% af maksimalgrænseværdierne (50-100% af MRL) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> MRL) i hhv. danske grøntsager, grøntsager dyrket i øvrige EU-lande og grøntsager dyrket i lande uden for EU (eller af ukendt oprindelse).

### 4.2.3 Korn, ris og majs (cerealier)

Der blev i 2020 udtaget i alt 129 stikprøver af konventionelt dyrkede cerealier. Fordelingen af antal prøver udtaget med oprindelse fra Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 3. I 1,6% af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskred MRL (se bilag 4). Andelen af prøver, hvor der kunne påvises pesticidrester, var 37%. Der blev fundet pesticidrester i 21% af prøverne produceret i Danmark, mens der i prøver produceret i EU og uden for EU blev fundet pesticidrester i henholdsvis 60% og 42% af alle prøver (se bilag 2.1 og bilag 3). Der blev ikke fundet overskridelser af MRL i prøver fra Danmark og øvrige EU-lande, mens der blev fundet overskridelser i 8,3% af prøverne med oprindelse uden for EU. Tilsvarende tal for tidligere år ses i figur 12.




**Figur 3**. Pesticidindhold i stikprøver af cerealier udtaget i 2020. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester intervallerne under 10 % af maksimalgrænseværdierne (≤ 10% af MRL), mellem 10% og 50% af maksimalgrænseværdierne (10-50% af MRL), mellem 50% og 100% af maksimalgrænseværdierne (50-100% af MRL) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> MRL) i hhv. danske cerealier og cerealier produceret i øvrige EU-lande og uden for EU (eller af ukendt oprindelse).

### 4.2.4 Anpriste kornprøver (stråforkortere)

At prøven er anprist i forhold til stråforkortere betyder, at den har været deklareret som "Dyrket uden brug af stråforkortere", "Natur+" e.lign., og derfor skal være dyrket uden brug af stråforkorterne chlormequat eller mepiquat. Der blev i 2020 målt for chlormequat og mepiquat i syv anpriste prøver (3 hvede, 1 rug, 1 havre, 1 fuldkorshvedemel og 1 grahamshvedemel). Der blev ikke fundet restindhold i nogen af prøverne. Prøver blev også analyseret for andre pesticider, og prøverne indgår i statistikkerne for cerealier (se afsnit 4.2.3).

### 4.2.5 Animalske produkter inkl. forarbejdede og økologiske

Der blev i 2020 udtaget 286 animalske prøver, heraf 5 økologiske af kød, mælk, æg og honning, hvoraf 216 prøver var dansk produceret og 70 prøver var produceret uden for EU. Der blev fundet pesticidrester (thiacloprid) i tre prøver af honning fra Danmark. Indholdene var under MRL (se bilag 2.1).

### 4.2.6 Forarbejdede vegetabilske produkter (inkl. økologisk)

Forarbejdede konventionelt producerede produkter (tørret abrikos, tørret figen, tørret jordbær, tørret æble, vin, sveske, melonkerner, kogt bulgur, cornflakes og tørret pasta)

udgjorde 79 prøver, hvoraf fem prøver var produceret i Danmark, 54 prøver fra lande i EU, mens 20 prøver var produceret uden for EU. Fem af de 79 prøver var økologiske. Der var pesticidrester i 39 prøver (49%). Ingen af disse overskred MRL. Der blev ikke påvist pesticidrester i de økologiske prøver (se bilag 2.1).

For forarbejdede produkter omregnes den MRL, der gælder for den rå afgrøde ved hjælp af en forarbejdningsfaktor til den værdi, der bruges ved vurdering af restindholdet i det forarbejdede produkt, så der på den måde tages hensyn til ændringer af pesticidindholdet ved forarbejdningen.

### 4.2.7 Babymad (inkl. økologisk)

Der blev udtaget tre prøver af babymad; alle tre prøver var konventionelt producerede. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.1).

### 4.2.8 Chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl

Stofferne er ikke længere godkendt til brug i EU. Ifølge en rapport, som EU-Kommissionen publicerede i december 2019, kan der ikke sættes toksikologiske referenceværdier for stofferne, da en skadelig virkning på generne ikke kan udelukkes. Det antages, at der ikke er en nedre tærskel for disse skadelige effekter.
Som konsekvens heraf har DTU Fødevareinstituttet siden august 2019 vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for alle indhold af de to stoffer.

Maksimalgrænseværdierne er sat ned til detektionsgrænsen på 0,01* mg/kg med virkning fra 13. november 2020. Inden dette tidspunkt blev fem stikprøver fra 2020 med indhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl over detektionsgrænsen men under den gældende MRL vurderet til, at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes.

## 4.3 Resultater af mistankeprøver

Det er vigtigt at bemærke, at fordelingen af typer af afgrøder i mistankekontrollen er en anden end i stikprøvekontrollen. Mistankekontrollen fokuserer på virksomheder og typer af afgrøder, hvor der er særlig risiko for at påvise restkoncentrationer og overskridelser af MRL.

### 4.3.1 National mistankekontrol

National mistankekontrol kan bl.a. bestå af prøver udtaget i lufthavnen og prøver udtaget på baggrund af kendskab, som kan begrunde en mistanke. En del import af frugt og grøntsager sker som direkte import fra lande uden for EU til specialbutikker, grønthandlere og restauranter via Københavns Lufthavn.

#### 4.3.1.1 Målrettede prøver, herunder direkte import

I 2020 blev der udtaget 82 prøver i lufthavnen og hos importører med direkte import fra lande uden for EU (se bilag 2.2). I 14 prøver (17%) blev der påvist pesticidrester i konentrationer, der overskred MRL. Det tilsvarende tal var 22% i 2019.

#### 4.3.1.2 Kontrol med importører – Kampagne

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2020 en kampagne hos fødevarevirksomheder, som importerer frugt, grøntsager og cerealier [13]. Kampagne havde fokus på pesticidrester og importørernes egenkontrol.

Kampagnens resultater viste, at der fortsat er behov for et fokus på importørers egenkontrol i forhold til pesticidrester i frugt, grønt og cerealier, når de importerer fra tredjelande.

Der blev udtaget 98 prøver (se bilag 2.4), og i 15 prøver (15%) kunne der påvises pesticidrester i koncentrationer, der overskred MRL. I kampagnen er der udtaget 15 prøver af ris, og i syv af disse prøver blev der fundet indhold over MRL. I disse syv prøver blev der i alt konstateret 15 overskridelser af MRL, fordi der i nogle prøver blev fundet flere stoffer i samme prøve. For en enkelt prøve var der tale fire overskridelser med forskellige pesticider. Fødevarestyrelsen har på baggrund af denne observation øget fokus på pesticidrester i ris.

### 4.3.2 EU-koordineret mistankekontrol, forordning 2019/1793

I 2020 er der udtaget 11 prøver til skærpet importkontrol i henhold til forordning 2019/1793 [11] (se bilag 2.5), hvor en række ikke-animalske fødevarer, som formodes at udgøre en særlig risiko for fødevaresikkerheden, er underlagt skærpet importkontrol, herunder offentlig kontrol for pesticidrester. Partier af afgrøder på listen i forordning 2019/1793 skal forhåndsanmeldes af importøren. I kontrollen tilbageholdes partierne, indtil kontrolresultatet foreligger. Kun partier, der overholder MRL, bliver frigivet til det danske marked.

To prøver af sesamfrø fra Indien er udtaget til analyse for pesticider, herunder ethylenoxid.

Der blev ikke fundet overskridelser af MRL i nogle af de 11 prøver udtaget under restriktionsforordningen.

## 4.4 Vurdering af fund i stikprøver og mistankeprøver

For fund i alle prøver – både stikprøver og mistankeprøver - er alle fundne overskridelser af MRL samt alle prøver, hvor der blev fundet rester af mere end et pesticid, blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD) og det accceptable daglige indtag (ADI). 25 prøver blev på denne baggrund vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller, at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes, mens alle øvrige prøver med overskridelser blev vurderet til at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssg risiko.

Af de 25 prøver var 7 prøver udtaget som stikprøver: Ris (land ikke oplyst) (tricyclazol og buprofezin), chili fra Tyrkiet (buprofezin), peberfrugt fra Tyrkiet, (buprofezin), vindrue fra Egypten (chlorpyrifos), tørret bønne fra Madagaskar (chlorpyrifos), ærter med bælg fra Peru (carbendazim og benomyl) og ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl). 18 prøver var udtaget som mistankeprøver, herunder udtaget som led i pesticidkampagnen om egenkontrol: Sød basilikum fra Thailand (triazophos, carbendazim og benomyl), hellig basilikum fra Thailand (chlorpyrifos), svampe fra Vietnam (dimethoat og chlorpyrifos), aubergine fra Thailand (omethoat), selleriblade fra Thailand (omethoat, quentozen, chlorpyrifos, tecnazen), dild fra Thailand (carbofuran og chlorpyrifos), frisk koriander fra Thailand (chlorpyrifos), limeblade fra Thailand (chlorpyrifos), aubergine fra Tyrkiet (omethoat), aubergine fra et EU-land (omethoat og dimethoat), daddel fra Egypten (carbendazim og benomyl), pære fra Tyrkiet (diflubenzuron), sød basilikum fra Thailand (chlorpyrifos), ris fra Indien (tricyclazol), ris fra Indien (buprofezin, tricyclazol), ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl, tricyclazol), hvide ris fra Pakistan (carbendazim og benomyl) og bukkehornsblade fra Indien (chlorpyrifos, tricyclazol).

I fem stikprøver, hvor der blev påvist chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl (appelsin, banan, citron og to mandariner) blev det vurderet, at en sundhedsmæssigrisiko ikke kunne udelukkes på trods af, at MRL ikke var overskedet. Læs mere i afsnit 4.2.8 og se en oversigt i bilag 4.

Prøverne udtaget i henhold til forordning 2019/1793 blev tilbageholdt, indtil analyseresultatet forelå. Partierne kunne derfor afvises ved grænsen, hvis der var konstateret overskridelser. For øvrige prøver, hvor partierne allerede var på markedet, og hvor overskridelsen blev vurderet til kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes, blev partierne trukket tilbage fra markedet.

**Ethylenoxid**
Ethylenoxid er ikke godkendt til brug som pesticid i EU, men stoffet bruges andre steder i verden til gasning af fødevarer for at bekæmpe bakterier og andre skadevoldere i fødevarer. Etylenoxid er klassificeret som et stof, der har et genotoksisk og kræftfremkaldende potentiale. Det antages, at der ikke er en nedre tærskel for genotoksiske effekter.

I september 2020 blev der fundet høje koncentrationer af ethylenoxid i sendinger af sesamfrø importeret til EU fra Indien. Da det ikke kan udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af ethylenoxid i fødevarer, blev der derfor indført skærpede betingelser for import af sesamfrø fra Indien. Fødevarestyrelsen har i forlængelse af dette haft en del tilbagetrækningsager på baggrund af oplysninger om fund af ethylenoxid i mange typer af fødevarer, herunder tilsætningsstoffer.

Da Fødevarestyrelsen for indeværende ikke selv udfører analyse af ethylenoxid, bliver Fødevarestyrelsens kontrolanalyser i forbindelse med den aktuelle importkontrol udført på eksternt laboratorium. Der blev i 2020 udtaget to importprøver af sesamfrø med henblik på analyse for ethylenoxid. Analyserne viste ikke indhold af ethylenoxid.

# 5 Økologiske fødevarer

## 5.1 Regler og kontrol

Anvendelse af pesticider i den økologiske produktion er – bortset fra få undtagelser – ikke tilladt [12]. Ikke tilladte pesticider bør derfor som udgangspunkt ikke kunne findes i økologiske fødevarer. Det betyder imidlertid ikke, at der nødvendigvis vil være tale om en overtrædelse af økologireglerne, hvis der påvises et lille indhold af pesticider, idet der f.eks. kan være tale om en uundgåelig miljøforurening.

Da økologiforordningerne ikke indeholder bestemmelser om tilladte restkoncentrationer af pesticider, skal der ved hvert fund foretages en konkret vurdering af indholdet, og om indholdet evt. kan skyldes en uundgåelig forurening, f.eks. fra tidligere tiders anvendelse eller vinddrift fra en nabomark.

Det undersøges, om forureningen kan være sket på den virksomhed, hvor prøven er udtaget, eller i et af de tidligere led i distributions-/produktionskæden. Hvis produkterne eller råvarerne kommer fra udlandet, retter de danske myndigheder en forespørgsel til leverandørens kontrolorgan[1] for om muligt her at finde årsagen til tilstedeværelse af pesticiderne. Desuden indhentes en vurdering fra DTU Fødevareinstituttet, der vurderer sandsynligheden for, at der kan være tale om bevidst anvendelse ud fra erfaringer fra tidligere års kontrol.

Svaret fra DTU og de involverede kontrolorganer ligger til grund for Fødevarestyrelsens vurdering af, om økologireglerne er blevet overholdt, når der findes indhold af pesticider i en økologisk fødevare, som virksomheden forhandler.

## 5.2 Resultater for stikprøver af økologiske vegetabilske varer

Der blev i stikprøvekontrollen i 2020 udtaget i alt 145 prøver af vegetabilske fødevarer, herunder 46 prøver af frugt, 54 prøver af grøntsager, 40 prøver af cerealier, 5 forarbejdede fødevarer og 5 prøver af animalske fødevarer solgt som økologisk produceret (se Bilag 2.1).

Der blev ikke påvist restindhold i de animalske prøver.

I syv økologiske vegetabilske prøver (4,7%) blev der fundet pesticidrester. Det drejer sig om en prøve vindruer fra Egypten, to prøver af persille fra Italien, en prøve salat fra Italien og en prøve tomat fra fra Spanien, samt to prøver af havregryn fra Tyskland. Alle prøver, undtagen prøverne af havregryn fra Tyskland, indeholdt enten spinosad og/eller azadirachtin, som begge er godkendt til brug i den økologiske produktion. Prøverne blev derfor vurderet at være i overenstemmelse med varestandarden.
De to prøver af havregryn fra Tyskland indeholdt begge chlormequat. Havren blev ikke nedklassificeret i Tyskland, da prøverne taget i oprindelseslandet umiddelbart efter høst i 2019 ikke viste nogen indhold af chlormequat.

## 5.3 Kontrol af import af økologiske produkter fra Ukraine, Kazakhstan og Rusland m.fl. (mistankeprøver)

I et særligt projekt blev der som led i en EU-koordineret kontrol udtaget 26 prøver til kontrol af importerede økologiske prøver fra Ukraine, Kazakhstan og Rusland m.fl.
(Se Bilag 2.3). Der er ikke påvist pesticidrester i nogen af prøverne.

[1] *Et kontrolorgan er en uafhængig privat tredjepart, der foretager inspektion og certificering f.eks. inden for økologisk produktion.*

# 6 Fokusafgrøder

Siden 2006 har antallet af udtagne prøver for seks udvalgte afgrøder været relativt stabilt. Dette er sket for at følge tendenser i disse afgrøder mht. fund og overskridelser. De seks afgrøder udgør en væsentlig del af danskernes kost, og de findes på det danske marked med både dansk og udenlandsk oprindelse. Endvidere repræsenterer fokusafgrøderne typer af afgrøder med forskellige vækstbetingelser. De seks udvalgte afgrøder er: Gulerod, jordbær, tomat, pære, æble og hvede.

I figurerne 4-9 er tendensen for antal prøver med fund og overskridelser af pesticidrester vist for perioden 2016-2020. Antal prøver med fund er opgjort for dansk producerede afgrøder over for udenlandsk producerede afgrøder.

Påvisninger for årene 2016-2020 er opgjort i fire kategorier "under 10% af MRL", "mellem 10-50% af MRL", "mellem 50-100% af MRL" og "over MRL".




| Gulerod | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 21 | 15 | | | |
| 2017 | 24 | 8 | | | |
| 2018 | 21 | 6 | 1 | | |
| 2019 | 28 | 3 | | | 1 |
| 2020 | 21 | 3 | | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 6 | 11 | 2 | 1 | |
| 2017 | 7 | 9 | 1 | | 2 |
| 2018 | 10 | 7 | 2 | | |
| 2019 | 13 | 7 | | 1 | |
| 2020 | 8 | 11 | | | |

**Figur 4**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2016-2020 for gulerødder.

I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund været faldende i perioden 2016-2020, idet antallet faldt fra 42% til 12%. For udenlandske gulerødder ses der ingen klar tendens i fem-årsperioden, men en stigning fra 2019 til 2020 med 20% fra 38% til 58%.




| Jordbær | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 17 | 27 | 1 | | |
| 2017 | 11 | 25 | 1 | | |
| 2018 | 12 | 30 | 2 | | |
| 2019 | 15 | 32 | 3 | | |
| 2020 | 1 | 14 | 2 | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 5 | 18 | 8 | 1 | |
| 2017 | 8 | 17 | 7 | 1 | |
| 2018 | 5 | 19 | 4 | 1 | |
| 2019 | 4 | 16 | 5 | 3 | |
| 2020 | 1 | 22 | 4 | | 1 |

**Figur 5**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2016-2020 for jordbær.

For dansk producerede jordbær i 2020 er andelen af prøver med restindhold 94%, hvilket er en stigning i forhold til de tidligere år. Det bemærkes dog, at der kun er udtaget 17 prøver i 2020 mod 50 prøver i 2019. For udenlandsk producerede jordbær ses også en stigning, idet der findes restindhold i 96% af alle udenlandske jordbær.




| Tomat | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 23 | 2 | 1 | | |
| 2017 | 14 | 2 | | | |
| 2018 | 20 | 1 | 1 | | |
| 2019 | 18 | 5 | | | |
| 2020 | 18 | 1 | | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 17 | 9 | 4 | | |
| 2017 | 10 | 10 | 6 | | |
| 2018 | 13 | 8 | 3 | 2 | |
| 2019 | 12 | 9 | 5 | | |
| 2020 | 11 | 8 | 5 | | |

**Figur 6**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2016-2020 for tomat.

Antal prøver med fund i danske tomater er 5% i 2020, hvilket er et fald på 13% i forhold til 2019. Påvisningsfrekvensen for udenlandske tomater er på niveau med de foregående år, idet der findes rester i 54% af prøverne. Det bemærkes, at alle påviste pesticidrester i danske tomater er under 10% af MRL.




| Pære | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 18 | 6 | | | |
| 2017 | 10 | 3 | | | |
| 2018 | 19 | 3 | | | |
| 2019 | 14 | 5 | | | |
| 2020 | 5 | 10 | | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 11 | 10 | | 1 |
| 2018 | 6 | 12 | 7 | | |
| 2019 | 3 | 22 | 5 | | |
| 2020 | | 18 | 5 | | |

**Figur 7**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2016-2020 for pære.

For dansk producerede pærer ses en stigning i andelen af prøver med pesticidrester fra 26% i 2019 til 67% i 2020, hvilket er en stigning med 41%. For de udenlandsk producerede pærer ser der også ud til at være en stigning i forhold til 2019, idet frekvensen er steget fra 90% til 100% i 2020.




| Æble | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 18 | 6 | | | 3 |
| 2017 | 16 | 4 | 3 | | |
| 2018 | 18 | 7 | 1 | | |
| 2019 | 14 | 11 | 1 | | |
| 2020 | 6 | 14 | 2 | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 9 | 15 | 3 | | |
| 2017 | 4 | 13 | 5 | | 1 |
| 2018 | 6 | 16 | 6 | | |
| 2019 | 6 | 12 | 5 | | 1 |
| 2020 | 4 | 16 | 8 | | |

**Figur 8**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2015-2019 for æble.

For dansk producerede æbler er andelen af prøver med restindhold steget i forhold til de foregående år, idet der findes restindhold i 73% af alle danske æbler. Dette er en stigning med 27% i forhold til 2019.

For de udenlandske æbler ses også en lille stigning i forhold til de foregående år, idet der findes rester i 86% af alle udenlandske æbler mod 75% i 2019.




| Hvede | Ikke påvist | ≤ 10% MRL | 10-50% MRL | 50-100% MRL | Over MRL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dansk produceret** | | | | | |
| 2016 | 37 | 17 | | | |
| 2017 | 22 | 13 | 3 | | |
| 2018 | 16 | 20 | | | |
| 2019 | 16 | 14 | | 1 | |
| 2020 | 20 | 11 | | | |
| **Udenlandsk produceret** | | | | | |
| 2016 | 11 | 21 | 3 | | |
| 2017 | 21 | 16 | 2 | | |
| 2018 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 7 | 32 | | | |
| 2020 | 6 | 20 | | | |

**Figur 9**. Udviklingen i fund af pesticidrester 2016-2020 for hvede.

Der ses et fald i antallet af prøver med indhold af dansk produceret hvede, idet der findes restindhold i 32% af alle prøver mod 48% i 2019. For udenlandsk produceret hvede er frekvensen af prøver med restindhold på niveau med de foregående år, idet der findes restindhold i 77% af prøverne i 2020 mod 82% i 2019.

Som det fremgår af figurerne 4-9, er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Generelt kan det for fokusafgrøderne siges, at andelen af prøver med fund af pesticidrester ligger på et niveau, der er mindre end 10% af MRL. For frugtafgrøderne æble, pære og jordbær ser det ud til, at der er en stigende tendens til prøver med indhold i både dansk og udenlandsk producerede. For grøntsagerne gulerod og tomat ser frekvensen derimod ud til at være faldende for dansk producerede afgrøder.

Der er mange forhold, der kan spille ind på udsving i antal fund af pesticidrester. Vejrforhold og andre faktorer de pågældende år kan resultere i flere eller færre problemer med f.eks. svampe- eller insektangreb og dermed ændret brug af pesticider. Ligeledes vil der være variation i avlernes valg af afgrøder og deres dyrkningsmetoder. For udenlandske afgrøder kan fordelingen mellem prøver fra forskellige lande (med forskellige brugsmønstre) variere fra år til år. Endvidere kan ændringer i analysemetodernes stofprofil og rapporteringsgrænser have indflydelse på påvisningsmulighederne. I 2020 blev der endvidere udtaget et mindre antal prøver i forhold til 2019, hvilket gør resultaterne mere usikre.

# 7 Fund og overskridelser i frugt, grøntsager og cerealier

De følgende tre figurer viser frekvensen af fund og overskridelser over de seneste fem år i stikprøver med mindst en påvisning (over eller under MRL), samt andelen af prøver med mindst en påvisning over MRL for stikprøver af konventionelt dyrket frugt, grøntsager og cerealier, produceret i henholdsvis Danmark, inden for EU og uden for EU.

Hensigten med figurerne er primært at vise frekvensen af fund og overskridelser over tid. Det er dog væsentligt at bemærke, at inden for hver gruppe varierer prøveplanernes typer af afgrøder fra år til år for bedre at dække det samlede udbud af varer – ikke mindst for prøver, der ikke udgør en væsentlig del af kosten. Dette kan have en indflydelse på de fundne påvisningsfrekvenser.

Tabellen under hver figur viser for hvert år andelen af ”Antal prøver med fund” og ”overskridelser” i forhold til ”Antal analyserede prøver”.

## Frugt

Figur 10 viser frekvensen af fund og overskridelser for frugt.
Andelen af prøver med mindst én påvisning ligger nogenlunde stabilt over den seneste 5-årige periode for prøver med oprindelse fra EU og uden for EU, mens andelen af prøver med påvisninger er steget i prøver fra Danmark fra 56% i 2019 til 78% i 2020. Som nævnt tidligere er antallet af danske frugtprøver halveret i 2020 i forhold til tidligere år (på grund af corona-nedlukningen), hvilket kan betyde, at billedet ikke er retvisende.

Der blev imidlertid ikke fundet overskridelser af grænseværdien i dansk frugt i 2020. For prøver fra EU og lande uden for EU var andelen af prøver med overskridelser i 2020 henholdsvis 0,5% og 4,0%.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 3/49/108 | 0/39/82 | 0/44/99 | 0/57/102 | 0/43/55 | antal prøver over MRL/antal påviste prøver/antal prøver i alt |
| EU | 4/227/314 | 6/230/301 | 1/194/269 | 6/203/285 | 1/188/219 | |
| Ikke EU | 13/210/283 | 8/151/206 | 6/173/214 | 2/164/204 | 7/131/174 | |

**Figur 10**. Andel af prøver med pesticidrester og andel af antal prøver med mindst én påvisning over MRL i konventionelt dyrket frugt produceret i Danmark, EU og uden for EU. Venstre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én påvisning (denne kan være under eller over MRL). Højre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én overskridelse af MRL. De aktuelle tal aflæses under figuren.

## Grøntsager

Figur 11 viser frekvensen af fund og overskridelser for grøntsager. Det generelle billede er, at andelen af prøver med restindhold er noget lavere for dansk producerede prøver, end for prøver fra EU og lande uden for EU. I danske grøntsager findes generelt også færre overskridelser end i grøntsager fra EU og uden for EU.

Frekvensen af prøver med restindhold i 2020 er steget i prøver fra både, Danmark, øvrige EU og lande uden for EU i forhold til 2019.

Andelen af prøver fra Danmark med overskridelser er på samme niveau som tidligere år, mens andelen af prøver med overskridelser fra EU (2,0%) er faldet lidt i forhold til tidligere år. Endelig er andelen af prøver med oprindelse uden for EU med overskridelser steget fra 7,2% i 2019 til 12% i 2020.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 2/74/270 | 4/53/196 | 2/46/210 | 2/40/221 | 1/35/142 | antal prøver over MRL/antal påviste prøver/antal prøver i alt |
| EU | 6/177/321 | 5/130/249 | 6/146/293 | 2/124/254 | 1/129/215 | |
| Ikke EU | 12/83/192 | 5/45/94 | 9/45/127 | 8/33/108 | 11/46/92 | |

**Figur 11**. Andel af prøver med pesticidrester og andel af antal prøver med mindst én påvisning over MRL i konventionelt dyrkede grøntsager produceret i Danmark, EU og uden for EU. Venstre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én påvisning (denne kan være under eller over MRL). Højre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én overskridelse af MRL. De aktuelle tal aflæses under figuren.

## Cerealier

Figur 12 viser frekvensen af fund og overskridelser for cerealier. Det generelle billede er, at andelen af prøver med restindhold er lavest i prøver fra Danmark sammenlignet med prøver fra EU og lande uden for EU. Der ses et fald i frekvensen af fund for danske prøver, mens der ses en stigning for prøver, der kommer fra lande uden for EU. Andelen af prøver med fund er nogenlunde stabil for prøver med oprindelse fra EU i perioden.

Der er ingen overskridelser i danske prøver og i prøver fra øvrige EU, mens andelen af prøver med overskridelser er nogenlunde den samme for prøver med oprindelse uden for EU sammenlignet med 2019.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 0/23/120 | 0/22/82 | 1/23/86 | 0/23/68 | 0/13/63 | antal prøver over MRL/antal påviste prøver/antal prøver i alt |
| EU | 0/37/75 | 5/35/85 | 2/50/94 | 1/50/85 | 0/25/42 | |
| Ikke EU | 2/9/36 | 2/9/21 | 1/10/25 | 2/5/22 | 2/10/24 | |

**Figur 12**. Andel af prøver med pesticidrester og andel af antal prøver med mindst én påvisning over MRL i konventionelt dyrket cerealier produceret i Danmark, EU og uden for EU. Venstre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én påvisning (denne kan være under eller over MRL). Højre akse i figuren: Andel af prøver med mindst én overskridelse af MRL. De aktuelle tal aflæses under figuren.

# 8 Påvisninger pr. prøve

Antallet af påvisninger pr. prøve (antal pesticidrester pr. stikprøve) i forhold til antallet af analyserede prøver er opgjort for konventionelt dyrkede, friske og dybfrosne frugter, samt grøntsager.

Nedenfor vises frekvensen af prøver uden påvisninger, med én påvisning samt med multiple påvisninger (mere end én påvisning) for dansk producerede afgrøder samt afgrøder produceret i andre EU-lande og lande uden for EU.




**Frugt**
Hyppighed af prøver af frugt med det viste antal påvisninger pr. prøve
Prøver: Stikprøver af frisk og dybfrost frugt
DK: 55 prøver; EU: 219 prøver; Ikke-EU: 174 prøver.

**Figur 13**. Hyppighed af prøver med; ingen, én eller flere samtidigt påviste pesticidrester for konventionelt dyrket frugt (frisk eller dybfrost) opdelt på dansk produceret, produceret i andre EU lande, hhv. lande uden for EU.




**Grøntsager**
Hyppighed af prøver af grøntsager med det viste antal påvisninger pr. prøve
Prøver: Stikprøver af frisk og dybfrost grøntsager
DK: 142 prøver; EU: 215 prøver; Ikke-EU: 92 prøver.

**Figur 14**. Hyppighed af prøver med; ingen, én eller flere samtidigt påviste pesticidrester for konventionelt dyrkede grøntsager (frisk eller dybfrost) opdelt på dansk produceret, produceret i andre EU lande, hhv. lande uden for EU.

For grøntsager er hyppigheden af prøver med ingen påvisninger større for de dansk producerede prøver end for udenlandske prøver, mens hyppigheden af prøver med flere forskellige stoffer er størst for de udenlandske prøver. For frugt er prøver med mange påviste pesticider primært fra lande uden for EU.

I bilag 5 ses hvor mange stikprøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve).

Det største antal fund var 12 forskellige pesticider fundet i en prøve citron fra Egypten. I en prøve af kørvel fra Kenya blev der fundet 11 pesticder, i en prøve af lime fra Brasilien blev der fundet 10 pesticider. I to prøver blev der fundet ni pesticider: Appelsiner fra den Sydafrikaske Republik og purløg fra Jordan.

Andelen af prøver med multiple fund udgjorde 34% af alle stikprøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og forarbejdede varer, hvilket er en stigning i forhold til 2019 på 9%.

Samlet set er der en større andel af stikprøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Der var 380 prøver med multiple fund produceret i eller uden for EU svarende til 42% af samtlige udenlandske prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og forarbejdede fødevarer. For danske prøver var der 46 prøver med multiple fund svarende til 15% af samtlige danske prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og forarbejdede varer. I begge tilfælde er de økologiske prøver inkluderet.

I bilag 5 ses også hvor mange mistankeprøver, der indeholdt multiple fund. Det højeste

antal blev fundet i selleriblade fra Thailand med indhold af 13 forskellige pestider.

Andelen af mistankeprøver med multiple fund udgjorde 24% af alle vegetabilske prøver udtaget under projekterne vedrørende national og EU-koordineret mistankekontrol, hvilket er på niveau med 2019 (22%). I seks stikprøver og 18 mistankeprøver blev der fundet mere end én overskridelse af MRL i samme prøve (se bilag 4).

I den aktuelle risikovurdering af multiple påvisninger af pesticider er Hazard Index metoden (HI) anvendt (se bilag 6). Risikovurdering af de multiple fund foretaget efter denne metode har vist, at HI er mindre end 1, dog bortset fra de prøver, hvor det er vurdereret, at der er en sundhedsmæssig risiko eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. HI mindre end 1 indikerer, at der er en ubetydelig sundhedsmæssig risiko ved kumulativt indtag af flere pesticider i fødevaren.

# 9 Pesticid-screening

Screeningsmetoder bruges til at screene prøver for indhold af pesticidrester. Metoderne kan påvise et muligt indhold af et stort antal forskellige pesticider, mens koncentrationen oftest ikke bestemmes præcist.

Der anvendes en del pesticider på verdensplan, som ikke indgår i det sædvanlige analyseprogram. Derfor udvikler DTU Fødevareinstituttet screeningsmetoder til bestemmelse af pesticidrester i fødevarer ved brug af højt opløselig massespektrometri. Dette arbejde er fortsat i 2020. Screeningsmetoder kan dække et bredt udsnit af pesticider, og hvis et pesticid gentagne gange findes ved screeningen, vil det blive prioriteret i det sædvanlige analyseprogram på lige fod med andre pesticider. Der fokuseres i screeningen på stoffer, der ligger uden for det sædvanlige analyseprogram.

Ved screeningen er analyseret prøver, som er udtaget i 2020 og allerede analyseret i analyseprogrammet på Fødevarestyrelsens laboratorium. Screeningsanalyser er udført på 115 prøver.

De 115 prøver bestod af 4 prøver fra EU-lande og 111 prøver fra 3. lande. Prøverne fordelte sig på forskellige afgrøder: 20 kaffebønner og te, 41 bær- og frugtprøver, 18 grøntsager, 7 krydderurter, 29 kornprøver (overvejende ris). Prøverne blev i alt screenet for indhold af 233 pesticider eller nedbrydningsprodukter af pesticider. Der er tilføjet 12 nye pesticider på listen, og 14 pesticider er fjernet, fordi de nu indgår i de kvantitative kontrolanalyser på Fødevarestyrelsens laboratorium.

Ved screeningen blev der kun fundet ét indhold af pesticider, som ikke allerede var medtaget i den kvantitative analyse. Pesticidet var fluoxastrobin, og det blev fundet i en ris-prøve fra Pakistan.

Metodeoplysninger samt en liste over pesticider og metabolitter inkluderet i screeningsprogrammet ses i bilag 1.2.

**Screeningsanalyser**
Ved det sædvanlige analyseprogram analyseres der primært for pesticider, der er vurderet relevante at kontrollere for ud fra en række kriterier som f.eks. kan være, at pesticidet er godkendt i Danmark, anvendes relativt hyppigt i Danmark, EU eller 3. lande, overskridelser af grænseværdier er rapporteret af andre lande, at det har høj toksicitet etc. Som supplement til dette sædvanlige program udfører DTU Fødevareinstituttet årligt screeningsanalyser af omkring 100 prøver. Ved screeningen analyseres der for indhold af pesticider eller metabolitter af pesticider, som ikke allerede er inkluderet i det sædvanlige analyseprogram. Derfor er der ikke specifikke kriterier for, hvilke stoffer der screenes for.
For de pesticider, der inkluderes i screeningsprogrammet, er der ved DTU Fødevareinstituttet bestemt en screeningsdetektionsgrænse (SDL). Dette gøres ved at teste, om metoden kan detektere de relevante pesticider tilsat i kendte mængder til 20 prøver af fødevarer. SDL for et pesticid kan sættes til det lavest testede tilsætningsniveau, hvor metoden detekterer indholdet i 19 af de 20 testprøver. SDL bestemmes for alle pesticider i screeningsprogrammet for at have vished for, at hvis indhold ikke detekteres, så forekommer de ikke over SDL.

# 10 Konklusion

Rapporten sammenfatter resultaterne for det danske pesticidkontrolprogram. Der er i 2020 undersøgt 1751 prøver for restkoncentrationer af pesticider.

Der er udtaget prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgik både økologiske og konventionelt producerede fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grøntsager, så der undersøges flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst, og hvor restindholdet bidrager væsentligt til befolkningens eksponering for pesticidrester gennem kosten.

Resultaterne af analyseprogrammet viser følgende:

- Det overordnede billede for pesticidrester i fødevarer på det danske marked er – med udsving fra år til år – sammenligneligt med tidligere år.
- For konventionelt dyrket frugt er der fundet restindhold i 82% af prøverne.
- For konventionelt dyrkede grøntsager er der fundet restindhold i 47% af prøverne.
- For konventionelle prøver af frugt og grøntsager er der fundet overskridelser af maksimalgrænseværdier i henholdsvis 1,8 % og 2,9 % af prøverne.
- Der findes generelt flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grøntsager sammenlignet med dansk produceret frugt og grøntsager.
- I cerealier blev der fundet overskridelser i 1,6% af de konventionelt dyrkede prøver. Dog ingen overskridelser i danske prøver.
- I forarbejdede konventionelt producerede produkter blev der ikke fundet overskridelser af MRL.
- Der blev ikke fundet restindhold af pesticider i babymad.
- I animalske produkter blev der fundet restindhold under MRL i tre prøver af honning svarende til 1% af prøverne.
- I økologiske produkter udtaget som stikprøver, blev der fundet restindhold af pesticider i syv prøver svarende til 4,7% af de undersøgte økologiske prøver. Alle prøver blev vurderet at være i overensstemmelse med økologireglerne.
- I flere fødevarer var der indhold af flere forskellige pesticider i samme prøve. Disse indhold blev primært fundet i udenlandske prøver.
- 25 prøver med overskridelser af MRL blev vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller, at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes, mens alle øvrige prøver med overskridelser blev vurderet til at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.
- I alt fem stikprøver af appelsin, banan, citron og to mandariner med indhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl blev vurderet til – på trods af, at MRL ikke var overskredet - at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes.
- Prøver med fund af flere forskellige pesticider i samme prøve, blev vurderet at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.

Ud fra den nuværende viden vurderer Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, udgør en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. Indholdene af pesticidrester påvirker derfor ikke kostrådet om at indtage frugt og grønt

# 11 Referencer


1. Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91

2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. Grænseværdierne i bilagene kan findes i følgende database: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

3. EU`s moniteringsrapport 2019 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6491

4. Poulsen M.E., Andersen J.H., Petersen A., Hartkopp H. (2005). "Pesticides, Food Monitoring 1998-2003, part 2". ISBN 87-91569-54-0.

5. Petersen A., Jensen B.H., Andersen J.H., Poulsen M.E., Christensen T., Nielsen E. (2013). "Pesticides Residues, Results from the period 2004-2011, ISBN 978-87-92763-78-5.

6. Jensen B.H. Petersen A., Petersen P.B., Poulsen M.E., Nielsen E., Christensen T. Fagt S. Trolle E. Andersen J.H. (2019). Pesticides Residues in food on the Danish market. Results from the period 2012-2017, ISBN 978-87-935-45-6

7. Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF

8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets Direktiv Rådets 79/117/EØF og 91/414/EØF

9. EU´s pesticide-database: https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

10. Rapid Alert System for Food and Feed. (RASFF): https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/implementing-regulation-and-guidance_en

11. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660

12. Økologiforordning KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol – bilag II: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20210101

13. Slutrapport for kampagnen - Egenkontrol med fokus på pesticidrester https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Pesticider/Slutrapport%20-%20Egenkontrol%20med%20fokus%20p%C3%A5%20pesticidrester.pdf

# Bilag 1.1

# Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder

Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider og antal stikprøver, der er analyseret. Som rapporteringsgrænser anvendes kvantificeringsgrænsen. I nogle tilfælde er der angivet to rapporteringsgrænser, disse er for forskellige analysemetoder.
For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat for en sum af flere stoffer, er påvisningerne (se bilag 2) anført for summen og ikke for hvert indgående stof.
I nogle tilfælde indgår der altså flere stoffer i restdefinitionen til monitering, og disse stoffer kan være konjugater, isomerer og nedbrydningsprodukter. Restdefinitionen til monitering kan findes i EU´s pesticid-database [9].
Forarbejdede produkter analyseres for de samme stoffer som uforarbejdede produkter afhængigt af hovedbestanddelen.

**Analyserede stoffer angivet som restdefinitioner i forskellige matricer**

| Pesticid (restdefinition) | **Frugt og grøntsager uforarbejdet** | | **Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet** | | **Animalske produkter (inkl. mælk og forarb.)** [14,15] | | **Babymad** | | **Honning** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stikprøver | Rapporteringsgrænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporteringsgrænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporteringsgrænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporteringsgrænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporteringsgrænse (mg/kg) |
| 2,4-D (sum)[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,01 |
| 2-Naphtoxyacetic acid[7,8] | 42 | 0.01-0.08 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| 2-phenylphenol (sum)[13] | 970 | 0.05-0.1 | 159 | 0.02-0.1 | 51 | 0,05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| 4-Chlorphenoxyacetic acid[7,8] | 42 | 0.01-0.05 | 49 | 0.01-0.05 | | | | | 30 | 0,01 |
| AMPA[6,9] | 85 | 0,05 | 118 | 0,05 | | | | | | |
| Abamectin (sum)[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Acephat | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Acetamiprid | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Aclonifen[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Aldicarb (sum) | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Aldrin+dieldrin (sum) [13] | 970 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 256 | 0.01-0.02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Ametoctradin[10] | 997 | 0.005-0.05 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Amidosulfuron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Amitraz (sum) [10] | 997 | 0.01-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,02 |
| Atrazin | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Avermectin B1a | | | | | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | | |
| Azadirachtin[10] | 788 | 0.005-0.01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Azamethiphos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Azinphos-ethyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0.01-0.04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Azinphos-methyl[10,13] | 768 | 0.005-0.01 | 155 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Azoxystrobin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Benalaxyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Bendiocarb[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Bensulfuron-methyl[7] | 42 | 0.01-0.02 | 8 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Bentazon (sum)[12] | 268 | 0.005-0.01 | 59 | 0.005-0.01 | | | | | | |
| Benzobicyclon[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Bifenthrin[13] | 970 | 2,5 | 159 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Biphenyl[10,13] | 768 | 0.05-0.1 | 112 | 0,1 | | | 3 | 0,1 | | |
| Bitertanol[10] | 997 | 0.01-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Bixafen | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Boscalid | 997 | 0.005-0.05 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Bromid[1] | | | 12 | 5 | | | | | | |
| Bromophos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Bromophos-ethyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Bromopropylat[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Bromoxynil[7,8] | 42 | 0.01-0.1 | 49 | 0.01-0.08 | | | | | 30 | 0,02 |
| Bromuconazol (sum)[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Bupirimat | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Buprofezin | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Cadusafos[10] | 997 | 0.005-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Carbaryl | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Carbendazim og benomyl | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | | |
| Carbendazim og thiophanat-methyl) | | | | | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Carbofuran (sum) | 997 | 0.005-0.04 | 159 | 0.01-0.05 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Carbophenothion[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Carboxin (sum) | 997 | 0.005-0.02 | 159 | 0,02 | 51 | 0.01-0.02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Chlorantraniliprol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Chlorbenzilat[10,13] | 768 | 0.005-0.01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Chlorbufam[10,13] | 768 | 0.005-0.01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Chlordan (sum) | | | | | 205 | 0,01 | | | | |
| Chlorfenapyr[13] | 970 | 0.01-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Chlorfenson[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Chlorfenvinphos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Chlormephos[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,01 |
| Chlormequatchlorid[2] | 28 | 0,01 | 128 | 0,01 | | | | | | |
| Chlorothalonil[3] | 77 | 0.01-0.02 | 22 | 0.01-0.02 | | | | | | |
| Chlorpropham[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Chlorpyrifos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,001 | 30 | 0,01 |
| Chlorpyrifos-methyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Chlorthal-dimethyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Cinidon-ethyl[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cinosulfuron[10] | 997 | 0.01-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Clethodim (sum) | 997 | 0.005-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Clodinafop[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Clofentezin | 997 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Clomazone | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Clopyralid (3,6 DCP)[7] | 42 | 0.01-0.02 | 8 | 0,01 | | | | | | |
| Clothianidin[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Coumaphos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Cyanazin | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cyazofamid[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cycloxydim (sum)[10] | 997 | 0.005-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Cyfluthrin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cyhalothrin, lambda-[13] | 960 | 0.005-0.05 | 47 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Cyhexatin (sum)[4] | 19 | 0,01 | | | | | | | | |
| Cymoxanil | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cypermethrin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Cyproconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Cyprodinil[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 50 | 0,01 | 1 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Cyromazin | 997 | 0.005-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| DDT (sum)[13] | 970 | 0,01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0.01-0.02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| DNOC[12] | 268 | 0,01 | 59 | 0,01 | 1 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |
| Deltamethrin[13] | 970 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Demeton-S-methyl[11] | 209 | 0,01 | 47 | 0,01 | 1 | 0,01 | | | | |
| Dialifos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Diazinon[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Dichlofenthion[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Dichlofluanid[13] | 970 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 51 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,01 |
| Dichlorprop (sum)[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Dichlorvos | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,04 |
| Diclofop (sum)[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Dicloran | 977 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Dicofol (sum)[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Dicrotophos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Diethofencarb | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Difenoconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Diflubenzuron | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Diflufenican | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Dimethoat | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Dimethomorph[10] | 997 | 0.005-0.05 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Dimoxystrobin[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Diniconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Dinocap (sum)[12] | 268 | 0.02-0.1 | 16 | 0.02-0.1 | 1 | 0,02 | | | 30 | 0,02 |
| Dinotefuran[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Dinoterb (sum)[12] | 268 | 0.005-0.01 | 59 | 0.005-0.01 | 1 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |
| Dioxathion[13] | 970 | 0.005-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Diphenylamin[13] | 970 | 0,01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Disulfoton (sum)[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Ditalimfos[13] | 970 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 51 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,02 |
| Dithiocarbamater[5] | 64 | 0,04 | 27 | 0,04 | | | | | | |
| Diuron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Doramectin[9,10] | 997 | 0.01 | 116 | 0.01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| EPN[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Emamectin[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,001 | 30 | 0,01 |
| EmamectinbenzoatB1b[9,10] | 788 | 0.0005-0.001 | 112 | 0,0009 | | | 3 | 0,001 | | |
| Endosulfan (sum)[13] | 970 | 0,01 | 159 | 0.01-0.05 | 256 | 0.01-0.05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Endrin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Epoxiconazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Ethiofencarb | 997 | 0.01-0.05 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Ethion[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Ethirimol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Ethoprophos[10] | 997 | 0.005-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,001 | 30 | 0,02 |
| Etofenprox[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Etoxazol[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Etrimfos[13] | 970 | 0.005-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Famoxadon[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenamidon[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fenamiphos (sum)[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenarimol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenazaquin[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fenbuconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenbutatin-oxid[4] | 19 | 0,01 | | | | | | | | |
| Fenchlorphos (sum)[10] | 768 | 0.005-0.01 | 155 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Fenhexamid | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Fenitrothion[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fenoxaprop[7] | 42 | 0.01-0.02 | 8 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Fenoxaprop-P-ethyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenoxycarb[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fenpropathrin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenpropidin | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenpropimorph[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,01 | | |
| Fenpyroximat[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenson[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fenthion (sum)[10] | 997 | 0.01-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,1 | 30 | 0,02 |
| Fentin[4] | 19 | 0,01 | | | | | | | | |
| Fenvalerate og esfenvalerate (sum)[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 153 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fipronil (sum)[12] | 268 | 0,01 | 16 | 0,01 | 32 | 0.003-0.01 | | | 30 | 0,01 |
| Fipronil-sulfid[9,12] | 268 | 0.005-0.01 | 16 | 0.005-0.01 | 32 | 0.003-0.01 | | | 30 | 0,02 |
| Flamprop-M-isopropyl | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Flamprop-methyl[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Flonicamid (sum) | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Florasulam[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fluazifop-P (sum) | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Flucythrinat[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fludioxonil[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Flufenacet (sum)[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Flufenoxuron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Fluopicolid[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fluopyram | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Flupyrsulfuron-methyl[10] | 997 | 0.01-0.05 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Fluquinconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,001 | 30 | 0,02 |
| Fluroxypyr (sum)[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Flurtamon[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Flusilazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Flutolanil[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Flutriafol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Fluvalinat, tau-[13] | 970 | 0.005-0.02 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Fluxapyroxad | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Fonofos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Formetanat[10] | 788 | 0.05-0.1 | 112 | 0,1 | | | 3 | 0,1 | | |
| Fosthiazat[10,13] | 768 | 0,01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Fuberidazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Glyphosat[6] | 85 | 0,05 | 118 | 0,05 | | | | | | |
| HCH, alfa-[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| HCH, beta-[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Haloxyfop (sum)[7] | 42 | 0.01-0.02 | 8 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Heptachlor (sum)[13] | 970 | 0.005-0.1 | 159 | 0.04-0.1 | 256 | 0.01-0.05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Heptenophos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Hexachlorbenzen[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0.01-0.05 | 256 | 0.01-0.04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Hexaconazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Hexaflumuron[12] | 268 | 0.005-0.01 | 16 | 0.005-0.01 | 1 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |
| Hexazinon | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Hexythiazox | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Imazalil | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Imidacloprid | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Indoxacarb[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Iodosulfuron-methyl | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Ioxynil[12] | 268 | 0.005-0.01 | 59 | 0.005-0.01 | 1 | 0,01 | | | | |
| Iprodion[13] | 970 | 0.01-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | | | 1 | 0,01 | | |
| Iprovalicarb | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Isocarbophos | 977 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Isofenphos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Isofenphos-methyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Isoprocarb[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Isoprothiolan[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Isoproturon | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Isoxathion[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Ivermectin[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Jodfenphos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Kresoxim-methyl[13] | 970 | 0.01-0.04 | 159 | 0.02-0.05 | 2 | 0,04 | 1 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Lindan[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Linuron | 997 | 0.01-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Lufenuron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| MCPA (sum)[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Malathion-Malaoxon (sum) | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Mandipropamid | 997 | 0.005-0.1 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Mecarbam[10] | 997 | 0.01-0.05 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Mecoprop (sum)[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Mepanipyrim[10] | 997 | 0.01-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Mepiquatchlorid[2] | 28 | 0,01 | 128 | 0,01 | | | | | | |
| Mesotrion[7] | 42 | 0.01-0.04 | 8 | 0,01 | | | | | 30 | 0,04 |
| Metaflumizon[12] | 268 | 0,01 | 16 | 0,01 | 1 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Metalaxyl | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | | |
| Metamitron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Metconazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Methacrifos[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Methamidophos | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Methidathion[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Methiocarb (sum) | 997 | 0.005-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Methomyl | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Methoxychlor[10,13] | 970 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Methoxyfenozid[10] | 788 | 0.05-0.1 | 112 | 0,1 | | | 3 | 0,1 | | |
| Metolachlor (sum) | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Metrafenon | 997 | 0.005-0.1 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Metribuzin | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Mevinphos (sum)[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Mirex[10,13] | 970 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Molinat[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Monocrotophos | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Monolinuron[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Moxidectin[9,10] | 997 | 0.01 | 116 | 0.01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Myclobutanil[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 2 | 0,01 | 1 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Nikotin[10] | 788 | 0.01-0.1 | 112 | 0,1 | | | 3 | 0,01 | | |
| Nitenpyram[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Nitrofen[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Nuarimol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Ofurace[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Omethoat | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Oxadiazon[10] | 997 | 0.01-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Oxadixyl | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Oxamyl | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Oxydemeton-methyl (sum) | 997 | 0,01 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Paclobutrazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Parathion[13] | 970 | 0.01-0.04 | 159 | 0.01-0.05 | 256 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Parathion-methyl (sum) | 997 | 0,01 | 159 | 0.01-0.05 | 256 | 0.01-0.05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Penconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Pencycuron | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Pendimethalin | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Pentachloranisol[9,13] | 970 | 0,01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Pentachlorbenzen[9,13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Pentachlorthioanisol[9,13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Permethrin (sum)[13] | 970 | 0.01-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Phenmedipham[10] | 997 | 0.01-0.05 | 116 | 0.02-0.05 | 1 | 0,05 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Phenthoat[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Phorat (sum) | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Phosalon[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Phosmet[10,13] | 970 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Phosphamidon | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Phoxim[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Picolinafen[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Picoxystrobin | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | | |
| Piperonylbutoxid[9,10] | 997 | 0.01-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Pirimicarb | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Pirimicarb (sum) | | | | | 1 | 0,01 | 2 | 0,01 | | |
| Pirimiphos-ethyl[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Pirimiphos-methyl | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Prochloraz (sum) | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Procymidon[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | | |
| Procymidon (sum) | | | | | 51 | 0,04 | 2 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Profenofos[13] | 970 | 0,01 | 159 | 0,01 | 256 | 0.01-0.1 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Propamocarb | 997 | 0.005-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Propanil[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Propaquizafop[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Propargit[13] | 970 | 0.005-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Propham[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Propiconazol | 997 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Propoxur | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Propyzamid[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Proquinazid | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Prosulfocarb | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Prosulfuron[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Prothioconazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,1 |
| Prothiofos[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Pymetrozin | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Pyraclofos[10] | 997 | 0.01-0.05 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Pyraclostrobin | 997 | 0.005-0.05 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Pyrazophos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 206 | 0.01-0.04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Pyridaben | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og for-arb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) | Stik-prøver | Rapporte-rings-grænse (mg/kg) |
| Pyridaphenthion | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Pyrimethanil | 997 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Pyriproxyfen | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Quinalphos[13] | 970 | 0.005-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Quinoxyfen[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Quintozen (sum)[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 256 | 0.01-0.02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Quizalofop[7,8] | 42 | 0.01-0.02 | 49 | 0,01 | | | | | 30 | 0,02 |
| Resmethrin | | | | | 205 | 0,04 | | | | |
| Simazin[10] | 997 | 0.01-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Spinosad (sum)[10] | 997 | 0.003-0.01 | 116 | 0.005-0.01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,005 | 30 | 0,01 |
| Spirodiclofen[10,13] | 768 | 0.005-0.01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Spiromesifen | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Spiroxamin | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Sulfotep[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| TEPP[10] | 997 | 0.005-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Tebuconazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Tebufenozid | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Tebufenpyrad | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Tecnazen[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Teflubenzuron[12] | 261 | 0.005-0.01 | 59 | 0.005-0.01 | 51 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |
| Tefluthrin[10,13] | 768 | 0.005-0.01 | 112 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | |
| Tepraloxydim (sum)[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Terbuthylazin | 997 | 0.005-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Tetrachlorvinphos[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Tetraconazol[13] | 970 | 0.01-0.04 | 159 | 0.01-0.04 | 51 | 0,04 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Tetradifon[13] | 970 | 0,01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Tetrasul[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Thiabendazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Thiacloprid | 997 | 0.005-0.03 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Thiamethoxam | 997 | 0.005-0.03 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Thifensulfuron-methyl[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Thiobencarb[10] | 997 | 0.01-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Thiodicarb | 997 | 0.01-0.02 | 159 | 0.01-0.02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Thiometon[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0.01-0.05 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,05 |
| Thiophanat-methyl | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | | |
| Tolclofos-methyl[10] | 997 | 0,01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Tolylfluanid (sum)[13] | 970 | 0.01-0.05 | 159 | 0.01-0.05 | | | 1 | 0,1 | 30 | 0,05 |
| Tralkoxydim[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |

| Pesticid (restdefinition) | Frugt og grøntsager uforarbejdet | | Korn, mel, gryn o.l. uforarbejdet | | Animalske produkter (inkl. mælk og forarb.) [14,15] | | Babymad | | Honning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stikprøver | Rapporterings-grænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporterings-grænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporterings-grænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporterings-grænse (mg/kg) | Stikprøver | Rapporterings-grænse (mg/kg) |
| Triadimefon | 997 | 0,01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Triadimenol | 997 | 0.01-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Triallat | 997 | 0.005-0.1 | 159 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Triazophos | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 206 | 0.01-0.1 | 3 | 0,01 | 30 | 0,04 |
| Tribenuron-methyl[10] | 997 | 0.005-0.1 | 116 | 0.01-0.1 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Trichlorfon[10] | 997 | 0.01-0.02 | 116 | 0.01-0.02 | 1 | 0,02 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Trichloronat[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Tricyclazol | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Trifloxystrobin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Triflumizol[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Triflumuron | 997 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Trifluralin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0.01-0.02 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Triforin[11] | 209 | 0,01 | 4 | 0,01 | 1 | 0,01 | | | 30 | 0,01 |
| Triticonazol[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Vamidothion[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |
| Vinclozolin[13] | 970 | 0.005-0.01 | 159 | 0,01 | 51 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| Zoxamid[10] | 997 | 0.005-0.01 | 116 | 0,01 | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 30 | 0,02 |

1. Bromid, kun analyseret i nogle prøver af ris
2. Chlormequatchlorid og Mepiquatchlorid i frugt og grøntsager, kun analyseret i nogle prøver af gulerod og pære
3. Chlorthalonil, kun analyseret i nogle prøver af appelsin, blomkål, bønne, gulerod, kartofler, kiwi, løg, pære, salat, spidskål, ris og rug
4. Cyhexatin, Fenbutatin-oxid og Fentin, kun analyseret i nogle prøver af appelsin og pære
5. Dithiocarbamater, kun analyseret i nogle prøver af appelsin, bønnne, gulerod, kartoffel, kiwi, pære, byg, ris og rug
6. AMPA og Glyphosat, kun analyseret i nogle prøver af appelsin, blomkål, bønne, gulerod, kartoffel, kiwi, løg, pære samt cerealier nå nær majs
7. Stoffet er kun analyseret i nogle prøver af appelsin, blomkål, bønne, gulerod, løg, peberfrugt, pære, vindrue og ris
8. Stoffet analyseres pr 1. april 2020 ikke i alle prøver af korn, mel og gryn; men kun i nogle prøver af ris
9. Ikke-pesticider: AMPA, Doramectin, Emamectinbenzoat B1b, Fipronil-sulfid, Moxidectin, Pentachloranisol, Pentachlorbenzen, Pentachlorthioanisol, Piperonylbutoxid
10. Pr 1. april 2020 er stoffet medtaget i analysen for frugt og grønt og/eller korn, mel, gryn o.l.
11. Pr 1. april 2020 er stoffet udgået af analysen.
12. Pr 1. april 2020 analyseres kun udvalgte prøver for dette stof
13. Stoffet er ikke analyseret i te og vin
14. Følgende animalske produkter er analyseret: Kød, fedt, lever, æg, mælk og akvakulturer
15. Det er en prøve af mælkepulver, der er analyseret for flere stoffer end de øvrige produkter.

# Bilag 1.2

# Pesticider inkluderet i screeningsanalyser

Screeningsanalyserne foretages ved både LC-QTOF og GC-Orbitrap, og metoderne er valideret for 179 pesticider og metabolitter (nedbrydningsprodukter) af pesticider ud over de pesticider, der kvantificeres i det sædvanlige analyseprogram.

Metoderne er ikke akkrediteret på nuværende tidspunkt.
Som rapporteringsgrænse anvendes Screening Detection Limit (SDL). SDL er den koncentration, som metoden kan påvise.

| **Pesticid** | **Antal prøver analyseret** | **Rapporteringsgrænse (mg/kg)** |
|---|---|---|
| 1-Naphthylacetamid | 115 | 0,1 |
| 2,4,5-T-methylester | 115 | 0,01 |
| 2,4-Dimethylester | 115 | 0,01 |
| 2-3-5-Trimethacarb | 115 | 0,01 |
| 2-6-Dichlorbenzamid | 115 | 0,1 |
| 2-6-Dichlorbenzamid | 115 | 0,01 |
| 3-hydroxycarbofuran | 115 | 0,01 |
| 4,4'-Dichlorbenzophenon | 115 | 0,01 |
| 6-benzylaminopurin | 115 | 0,01 |
| Acetochlor | 115 | 0,01 |
| Acibenzolar-S-Methyl | 115 | 0,01 |
| Alachlor | 115 | 0,02 |
| Aldrin | 115 | 0,01 |
| Allethrin | 115 | 0,01 |
| Allidochlor | 115 | 0,01 |
| Ametryn | 115 | 0,01 |
| Aminocarb | 115 | 0,1 |
| Amisulbrom | 115 | 0,01 |
| Ancymidol | 115 | 0,01 |
| Anilofos | 115 | 0,01 |
| Anthraquinon | 115 | 0,1 |
| Aspon | 115 | 0,01 |
| Asulam | 115 | 0,01 |
| Atraton | 115 | 0,01 |
| Azaconazol | 115 | 0,1 |
| Aziprotryn | 115 | 0,01 |
| Beflubutamid | 115 | 0,01 |
| Benfluralin | 115 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Benfuracarb | 115 | 0,1 |
| Benodanil | 115 | 0,01 |
| Benoxacor | 115 | 0,01 |
| Bensulid | 115 | 0,01 |
| Benzovindiflupyr | 115 | 0,01 |
| Benzoximat | 115 | 0,01 |
| Benzoylprop-ethyl | 115 | 0,01 |
| Bifenazat | 115 | 0,01 |
| Bifenox | 115 | 0,1 |
| Bromacil | 115 | 0,01 |
| Bromadiolon | 115 | 0,02 |
| Butachlor | 115 | 0,01 |
| Butafenacil | 115 | 0,01 |
| Butamifos | 115 | 0,01 |
| Butralin | 115 | 0,01 |
| Buturon | 115 | 0,01 |
| Butylat | 115 | 0,01 |
| Carbetamid | 115 | 0,01 |
| Carbosulfan | 115 | 0,1 |
| Carfentrazon-ethyl | 115 | 0,01 |
| Chlorbromuron | 115 | 0,1 |
| Chlordimeform | 115 | 0,01 |
| Chlorfluazuron | 115 | 0,01 |
| Chloridazon | 115 | 0,1 |
| Chlorimuron-ethyl | 115 | 0,01 |
| Chlorbenzilat | 115 | 0,01 |
| Chloroneb | 115 | 0,01 |
| Chlortoluron | 115 | 0,01 |
| Chloroxuron | 115 | 0,01 |
| Chlorpropylat | 115 | 0,1 |
| Chlozolinat | 115 | 0,1 |
| Chromafenozid | 115 | 0,02 |
| Clodinafop-propargyl | 115 | 0,01 |
| Crimidin | 115 | 0,01 |
| Crufomat | 115 | 0,01 |
| Cyanophos | 115 | 0,01 |
| Cyantraniliprol | 115 | 0,01 |
| Cycloat | 115 | 0,01 |
| Cycluron | 115 | 0,1 |
| Cyflufenamid | 115 | 0,1 |

| | | |
|---|---|---|
| Cyflumetofen | 115 | 0,01 |
| Cyprazin | 115 | 0,01 |
| Daimuron | 115 | 0,01 |
| DEET | 115 | 0,01 |
| Desmedipham | 115 | 0,01 |
| Desmetryn | 115 | 0,01 |
| Diafenthiuron | 115 | 0,01 |
| Dibutyl_chlorendat | 115 | 0,03 |
| Dicapthon | 115 | 0,01 |
| Dichlobenil | 115 | 0,01 |
| Dichlormid | 115 | 0,02 |
| Diclobutrazol | 115 | 0,01 |
| Difenoxuron | 115 | 0,01 |
| Dimefuron | 115 | 0,01 |
| Dimethachlor | 115 | 0,02 |
| Dimethenamid | 115 | 0,01 |
| Dimethylvinphos_Z | 115 | 0,01 |
| Dioxacarb | 115 | 0,02 |
| Diphenamid | 115 | 0,01 |
| Dithiopyr | 115 | 0,01 |
| DMST | 115 | 0,1 |
| Dodemorph | 115 | 0,1 |
| Dodine | 115 | 0,01 |
| Edifenphos | 115 | 0,02 |
| Esprocarb | 115 | 0,01 |
| Etaconazol | 115 | 0,01 |
| Ethalfluralin | 115 | 0,01 |
| Ethiprol | 115 | 0,02 |
| Ethofumesat | 115 | 0,02 |
| Etridiazol | 115 | 0,1 |
| Famphur | 115 | 0,01 |
| Fenobucarb | 115 | 0,01 |
| Fenothiocarb | 115 | 0,04 |
| Fenoxaprop-ethyl | 115 | 0,01 |
| Fenpiclonil | 115 | 0,01 |
| Fenpyrazamin | 115 | 0,01 |
| Fensulfothion | 115 | 0,01 |
| Fensulfothion-sulfon | 115 | 0,01 |
| Fluacrypyrim | 115 | 0,05 |
| Fluazinam | 115 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluazuron | 115 | 0,01 |
| Flubendiamid | 115 | 0,01 |
| Fluchloralin | 115 | 0,01 |
| Flucycloxuron | 115 | 0,02 |
| Flumetralin | 115 | 0,02 |
| Flumetsulam | 115 | 0,01 |
| Flumioxazin | 115 | 0,1 |
| Fluometuron | 115 | 0,01 |
| Fluoroglycofen-ethyl | 115 | 0,1 |
| Fluoxastrobin | 115 | 0,01 |
| Flupyradifuron | 115 | 0,01 |
| Fluridon | 115 | 0,01 |
| Flurochloridon | 115 | 0,02 |
| Flurprimidol | 115 | 0,01 |
| Flutianil | 115 | 0,01 |
| Foramsulfuron | 115 | 0,01 |
| Forchlorfenuron | 115 | 0,01 |
| Formothion | 115 | 0,01 |
| Fosthiazate | 115 | 0,01 |
| Furalaxyl | 115 | 0,01 |
| Furathiocarb | 115 | 0,01 |
| Furilazol | 115 | 0,01 |
| Halofenozid | 115 | 0,01 |
| Hexazinon | 115 | 0,01 |
| Imazamethabenz-methyl | 115 | 0,01 |
| Imibenconazol | 115 | 0,01 |
| Inabenfid | 115 | 0,01 |
| Ipconazol | 115 | 0,01 |
| Iprobenfos | 115 | 0,01 |
| Isazophos | 115 | 0,01 |
| Isocarbamid | 115 | 0,01 |
| Isodrin | 115 | 0,01 |
| Isopyrazam | 115 | 0,1 |
| Isoxaflutol | 115 | 0,01 |
| Lenacil | 115 | 0,1 |
| Leptophos | 115 | 0,01 |
| Lethan | 115 | 0.01 |
| Mandestrobin | 115 | 0,01 |
| Mefenacet | 115 | 0,01 |
| Mefenpyr-Diethyl | 115 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Mepronil | 115 | 0,01 |
| Metazachlor | 115 | 0,01 |
| Methabenzthiazuron | 115 | 0,01 |
| Methopren | 115 | 0,02 |
| Methoxyfenozid | 115 | 0,01 |
| Metobromuron | 115 | 0,01 |
| Metolcarb | 115 | 0,01 |
| Metosulam | 115 | 0,01 |
| Mexacarbat | 115 | 0,02 |
| MGK-264 | 115 | 0,06 |
| Monuron | 115 | 0,07 |
| Napropamid | 115 | 0,01 |
| Naptalam | 115 | 0,1 |
| Neburon | 115 | 0,01 |
| Nicosulfuron | 115 | 0,01 |
| Nitrothal-isopropyl | 115 | 0,01 |
| Norflurazon | 115 | 0,01 |
| Novaluron | 115 | 0,02 |
| Oxadiargyl | 115 | 0,1 |
| Oxasulfuron | 115 | 0,01 |
| Oxycarboxin | 115 | 0,08 |
| Oxyfluorfen | 115 | 0,1 |
| Paraoxon-methyl | 115 | 0,01 |
| Pebulat | 115 | 0,1 |
| Penflufen | 115 | 0,02 |
| Penfluron | 115 | 0,09 |
| Penoxsulam | 115 | 0,01 |
| Pentachloranilin | 115 | 0,01 |
| Pentanochlor | 115 | 0,01 |
| Penthiopyrad | 115 | 0,1 |
| Pethoxamid | 115 | 0,01 |
| Phenothrin | 115 | 0,10 |
| Plifenat | 115 | 0,01 |
| Pretilachlor | 115 | 0.005 |
| Profluralin | 115 | 0,01 |
| Profoxydim | 115 | 0,01 |
| Prometon | 115 | 0,01 |
| Prometryn | 115 | 0,01 |
| Propachlor | 115 | 0,01 |
| Propaphos | 115 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Propazin | 115 | 0,01 |
| Pyraflufen-ethyl | 115 | 0,01 |
| Pyributicarb | 115 | 0,01 |
| Pyridalyl | 115 | 0,02 |
| Pyrifenox | 115 | 0,01 |
| Pyriofenon | 115 | 0,01 |
| Pyroxsulam | 115 | 0,01 |
| Quinmerac | 115 | 0,01 |
| Quinoclamin | 115 | 0,01 |
| Rabenzazol | 115 | 0,01 |
| Rotenon | 115 | 0,01 |
| Sebuthylazin | 115 | 0,01 |
| Secbumeton | 115 | 0,01 |
| Sedaxan | 115 | 0,01 |
| Siduron | 115 | 0,01 |
| Silafluofen | 115 | 0,01 |
| Simetryn | 115 | 0,01 |
| Spinetoram | 115 | 0,11 |
| Spirotetramat | 115 | 0,01 |
| Sulfoxaflor | 115 | 0,01 |
| Sulprofos | 115 | 0,1 |
| Tebupirimfos | 115 | 0,01 |
| Tebutam | 115 | 0,01 |
| Tebuthiuron | 115 | 0,01 |
| Terbufos | 115 | 0,01 |
| Terbumeton | 115 | 0,1 |
| Terbutryn | 115 | 0,01 |
| Tetrahydrophthalimid_cis-1-2-3-6 | 115 | 0,1 |
| Tetramethrin | 115 | 0,1 |
| Thenylchlor | 115 | 0,01 |
| Thiazopyr | 115 | 0,01 |
| Thiocyclam-hydrogen-oxalat | 115 | 0,1 |
| Tiocarbazil | 115 | 0.005 |
| Tolfenpyrad | 115 | 0,01 |
| Topramezon | 115 | 0,01 |
| Tralomethrin | 115 | 0,12 |
| Triasulfuron | 115 | 0,01 |
| Triazoxide | 115 | 0,01 |
| Tribufos | 115 | 0,01 |
| Trifloxysulfuron | 115 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Triflusulfuron-Methyl | 115 | 0,01 |
| Trinexapac-ethyl | 115 | 0,01 |
| Valifenalat | 115 | 0,01 |
| Vernolat | 115 | 0,01 |
| XMC | 115 | 0,02 |

# Bilag 2

# Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2020

Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver**,** der er analyseret for hvert produkt (fordelt på oprindelse; dansk og udenlandsk), og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Antallet af prøver med påviste pesticidrester findes som forskellen mellem disse to tal. Det er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester, der var for hver kombination af produkt og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Da der kan være påvist rester af flere pesticider i samme prøve, kan antal fund være højere end antal prøver.

Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af produkt og oprindelse. Her er angivet hvor mange prøver, der blev analyseret for det pågældende stof, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve, der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for det pågældende produkt/stof-kombination.

Forkortelser:
DK: Dansk produceret;
UDL: Udenlandsk produceret;
MRL: Maksimalgrænseværdi.

### Bilag 2.1 Konventionelt og økologisk dyrket frugt, grøntsager, cerealier, forarbejdede fødevarer, animalske produkter og babymad (stikprøver)

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| **Konventionelt dyrkt frugt, grøntsager 0.l. (friske og dybfrost)** | | | | | | | | | | | | | |
| Agurk | DK | 15 | 8 | 9 | | | Cyprodinil | 15 | 3 | | | 0,027 | 0,5 |
| | | | | | | | Propamocarb | 15 | 6 | | | 0,063 | 5 |
| Agurk | UDL | 25 | 3 | 67 | | | Acetamiprid | 25 | 3 | | | 0,07 | 0,3 |
| | | | | | | | Ametoctradin | 25 | 3 | | | 0,025 | 2 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 25 | 2 | | | 0,021 | 1 |
| | | | | | | | Boscalid | 25 | 1 | | | 0,007 | 4 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 25 | 1 | | | 0,008 | 0,3 |
| | | | | | | | Cyazofamid | 25 | 3 | | | 0,047 | 0,2 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 25 | 7 | | | 0,09 | 0,5 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 25 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 25 | 1 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Fenazaquin | 25 | 1 | | | 0,062 | 0,2 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 25 | 3 | | | 0,03 | 0,5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 25 | 5 | | | 0,025 | 0,4 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Fluopicolid | 25 | 4 | | | 0,038 | 0,5 |
| | | | | | | | Fluopyram | 25 | 6 | | | 0,053 | 0,5 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 25 | 1 | | | 0,007 | 0,2 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 25 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 25 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 25 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Propamocarb | 25 | 19 | | | 2,1 | 5 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 25 | 1 | | | 0,009 | 0,3 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 25 | 1 | | | 0,013 | 0,5 |
| | | | | | | | Triflumizol (sum) | 25 | 1 | | | 0,007 | 0,5 |
| Appelsin | UDL | 43 | 0 | 158 | 8 | 1 | 2-phenylphenol (sum) | 43 | 10 | | | 4,9 | 10 |
| | | | | | | | 2,4-D (sum) | 10 | 1 | | | 0,13 | 1 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 43 | 4 | | | 0,04 | 0,9 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 43 | 2 | | | 0,02 | 15 |
| | | | | | | | Buprofezin | 43 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 43 | 6 | | | 0,05 | 0,2 |
| | | | | | | | Chlorpropham | 43 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 43 | 5 | | | 0,024 | 1,5 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 43 | 2 | | | 0,046 | 2 |
| | | | | | | | Dithiocarbamater | 12 | 3 | | | 0,48 | 5 |
| | | | | | | | Fenpyroximat | 43 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 43 | 3 | | | 0,61 | 10 |
| | | | | | | | Fluvalinat, tau- | 43 | 1 | | | 0,019 | 0,4 |
| | | | | | | | Hexythiazox | 43 | 7 | | | 0,044 | 1 |
| | | | | | | | Imazalil | 43 | 36 | 5 | 1 | 5,6 | 4-5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 43 | 3 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Malathion-Malaoxon (sum) | 43 | 2 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Phosmet (sum) | 43 | 1 | | | 0,073 | 0,5 |
| | | | | | | | Prochloraz (sum) | 43 | 1 | | | 1,1 | 10 |
| | | | | | | | Propiconazol | 43 | 8 | | | 2,6 | 9 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 43 | 3 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 43 | 19 | | | 2,1 | 8 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 43 | 16 | | | 0,044 | 0,6 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 43 | 22 | 1 | | 5,9 | 7 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 43 | 2 | | | 0,025 | 0,5 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Asparges, grønne | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Asparges, grønne | UDL | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| Asparges, hvide | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Asparges, hvide | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Avocado | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Babymajs | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Banan | UDL | 14 | 2 | 31 | | | Azoxystrobin | 14 | 10 | | | 0,47 | 2 |
| | | | | | | | Bifenthrin | 14 | 4 | | | 0,023 | 0,1 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 14 | 1 | | | 0,023 | 4 |
| | | | | | | | Fenpro-pimorph | 14 | 2 | | | 0,005 | 0,6 |
| | | | | | | | Imazalil | 14 | 2 | | | 0,2 | 2 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 14 | 3 | | | 0,16 | 2 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 14 | 2 | | | 0,09 | 0,7 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 14 | 7 | | | 0,32 | 6 |
| Bladbede | DK | 2 | 0 | 5 | | 1 | Boscalid | 2 | 2 | | | 0,061 | 50 |
| | | | | | | | Mandipropa-mid | 2 | 2 | | | 0,17 | 25 |
| | | | | | | | Pirimicarb | 2 | 1 | | | 0,028 | 1,5 |
| | | | | | | | Prosulfocarb | 2 | | | 1 | 0,013 | 0,01 |
| Bladbede | UDL | 1 | 0 | 4 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,074 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,036 | 50 |
| | | | | | | | Chlorantrani-liprol | 1 | 1 | | | 0,006 | 20 |
| | | | | | | | Mandipropa-mid | 1 | 1 | | | 0,015 | 25 |
| Bladselleri | UDL | 1 | 0 | 2 | | | Azoxystrobin | 1 | 1 | | | 0,005 | 15 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 1 | 1 | | | 0,007 | 7 |
| Blomkål | DK | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| Blomkål | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Blomme | UDL | 17 | 6 | 23 | 3 | 1 | Azoxystrobin | 17 | 1 | | | 0,01 | 2 |
| | | | | | | | Boscalid | 17 | 7 | | | 0,12 | 3 |
| | | | | | | | Cyfluthrin | 17 | 1 | | | 0,007 | 0,2 |
| | | | | | | | Etofenprox | 17 | | 2 | 1 | 0,057 | 0,01 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 17 | 5 | | | 0,98 | 5 |
| | | | | | | | Phosmet (sum) | 17 | 1 | | | 0,007 | 0,6 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 17 | 3 | | | 0,022 | 0,8 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 17 | 5 | 1 | | 0,089 | 0.01-1 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Blåbær | UDL | 4 | 2 | 6 | | | Acetamiprid | 4 | 2 | | | 0,029 | 2 |
| | | | | | | | Boscalid | 4 | 2 | | | 0,049 | 15 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 4 | 1 | | | 0,13 | 20 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 4 | 1 | | | 0,057 | 2 |
| Broccoli | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Propamocarb | 1 | 1 | | | 0,01 | 3 |
| Brombær | UDL | 3 | 0 | 11 | | | Azoxystrobin | 3 | 1 | | | 0,012 | 5 |
| | | | | | | | Boscalid | 3 | 3 | | | 0,38 | 10 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 3 | 2 | | | 0,28 | 3 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 3 | 1 | | | 0,042 | 15 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 3 | 2 | | | 0,21 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 3 | 2 | | | 0,026 | 3 |
| Bønne, edamame u. bælg | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, heste | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, heste, tørret | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, hvid | UDL | 3 | 2 | | 1 | | Glyphosat | 2 | | 1 | | 2 | 2 |
| Bønne, kidney | UDL | 3 | 2 | | 1 | | Thiamethoxam | 3 | | 1 | | 0,026 | 0,04 |
| Bønne, mung | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Bønne, sort | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, tørret | UDL | 1 | 0 | | | 1 | Chlorpyrifos | 1 | | | 1 | 0,061 | 0,01 |
| Bønner med bælg | UDL | 15 | 5 | 18 | | | Azoxystrobin | 15 | 3 | | | 0,18 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 15 | 2 | | | 0,077 | 5 |
| | | | | | | | Cinidon-ethyl | 15 | 1 | | | 0,03 | 0,8 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 15 | 2 | | | 0,11 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 15 | 2 | | | 0,042 | 1 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 15 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Fluopyram | 15 | 5 | | | 0,067 | 1 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 15 | 1 | | | 0,009 | 2 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 15 | 1 | | | 0,014 | 1 |
| Chili | UDL | 14 | 2 | 25 | 1 | 3 | Acetamiprid | 14 | 1 | 1 | | 0,17 | 0,3 |
| | | | | | | | Buprofezin | 14 | | | 1 | 0,021 | 0,01 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 14 | 2 | | | 0,083 | 1 |
| | | | | | | | Clothianidin | 14 | | | 1 | 0,047 | 0,04 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 14 | 1 | | | 0,26 | 1,5 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 14 | 1 | | | 0,013 | 0,9 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal fund | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 14 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 14 | 1 | | | 0,29 | 1 |
| | | | | | | | Fluopyram | 14 | 4 | | | 0,045 | 3 |
| | | | | | | | Flutriafol | 14 | 2 | | | 0,28 | 1 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 14 | 1 | | | 0,13 | 1 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 14 | 2 | | | 0,063 | 0,3 |
| | | | | | | | Metrafenon | 14 | 2 | | | 0,14 | 2 |
| | | | | | | | Propamocarb | 14 | 3 | | | 0,018 | 3 |
| | | | | | | | Pyridaben | 14 | | | 1 | 0,037 | 0,01 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 14 | 2 | | | 0,19 | 1 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 14 | 1 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 14 | 1 | | | 0,054 | 0,7 |
| Citron | UDL | 17 | 2 | 58 | 5 | | 2-phenylphenol (sum) | 17 | 3 | | | 4,9 | 10 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 17 | 1 | | | 0,009 | 0,9 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 17 | 3 | | | 0,07 | 15 |
| | | | | | | | Boscalid | 17 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 17 | 1 | | | 0,016 | 0,7 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 17 | 1 | | | 0,035 | 1,5 |
| | | | | | | | Cyfluthrin | 17 | | 1 | | 0,016 | 0,02 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 17 | 1 | | | 0,037 | 2 |
| | | | | | | | Etofenprox | 17 | 1 | | | 0,009 | 1,5 |
| | | | | | | | Fenpyroximat | 17 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 17 | 3 | | | 0,056 | 10 |
| | | | | | | | Hexythiazox | 17 | 3 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Imazalil | 17 | 10 | 4 | | 3,6 | 5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 17 | 2 | | | 0,021 | 1 |
| | | | | | | | Propiconazol | 17 | 5 | | | 1,1 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 17 | 3 | | | 0,024 | 2 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 17 | 6 | | | 2,5 | 8 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 17 | 4 | | | 0,042 | 0,6 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 17 | 6 | | | 1,6 | 7 |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 17 | 1 | | | 0,011 | 6 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 17 | 2 | | | 0,01 | 0,5 |
| Fersken | UDL | 14 | 2 | 42 | | | Acetamiprid | 14 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Boscalid | 14 | 2 | | | 0,069 | 5 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,2 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 14 | 1 | | | 0,006 | 1 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 14 | 2 | | | 0,039 | 2 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 14 | 3 | | | 0,023 | 0,15 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 14 | 3 | | | 0,022 | 0,5 |
| | | | | | | | Etofenprox | 14 | 1 | | | 0,032 | 0,6 |
| | | | | | | | Fenbuconazol | 14 | 3 | | | 0,048 | 0,6 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 14 | 2 | | | 0,035 | 0,4 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 14 | 5 | | | 0,41 | 10 |
| | | | | | | | Fluopyram | 14 | 5 | | | 0,27 | 1,5 |
| | | | | | | | Penconazol | 14 | 1 | | | 0,009 | 0,15 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,3 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 14 | 4 | | | 0,06 | 0,6 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 14 | 5 | | | 0,098 | 0,6 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 14 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 14 | 1 | | | 0,03 | 3 |
| Figen, frisk | UDL | 8 | 7 | 2 | | | Carbendazim og benomyl | 8 | 1 | | | 0,013 | 0,1 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 8 | 1 | | | 0,005 | 0,02 |
| Glaskål | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Granatæble | UDL | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 | Acetamiprid | 18 | | 1 | 1 | 0,011 | 0,01 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 18 | 5 | | | 0,098 | 3 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 18 | 2 | | | 0,03 | 1 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 18 | 1 | | | 0,006 | 0,05 |
| Gulerod | DK | 24 | 21 | 4 | | | Azoxystrobin | 24 | 2 | | | 0,008 | 1 |
| | | | | | | | Boscalid | 24 | 1 | | | 0,098 | 2 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 24 | 1 | | | 0,014 | 0,5 |
| Gulerod | UDL | 19 | 8 | 18 | | | Aclonifen | 19 | 1 | | | 0,007 | 0,08 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 19 | 3 | | | 0,031 | 1 |
| | | | | | | | Boscalid | 19 | 5 | | | 0,016 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 19 | 1 | | | 0,012 | 0,4 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 19 | 2 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Fluopyram | 19 | 1 | | | 0,005 | 0,4 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 19 | 2 | | | 0,013 | 0,3 |
| | | | | | | | Prosulfocarb | 19 | 3 | | | 0,017 | 1 |
| Hindbær | UDL | 2 | 0 | 7 | | | Azoxystrobin | 2 | 2 | | | 0,02 | 5 |
| | | | | | | | Boscalid | 2 | 2 | | | 0,046 | 10 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Cyprodinil | 2 | 1 | | | 0,14 | 3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 2 | 1 | | | 0,11 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 2 | 1 | | | 0,005 | 3 |
| Hvidkål | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Johannes-brød | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Jordbær | DK | 17 | 1 | 42 | | | Azoxystrobin | 17 | 2 | | | 0,071 | 10 |
| | | | | | | | Boscalid | 17 | 9 | | | 0,067 | 6 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 17 | 6 | | | 0,46 | 5 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 17 | 1 | | | 0,015 | 10 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 17 | 10 | | | 0,48 | 4 |
| | | | | | | | Hexythiazox | 17 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 17 | 3 | | | 0,008 | 1,5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 17 | 3 | | | 0,34 | 5 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 17 | 4 | | | 0,019 | 0,3 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 17 | 3 | | | 0,035 | 1 |
| Jordbær | UDL | 28 | 1 | 99 | | 1 | Boscalid | 28 | 11 | | | 0,47 | 6 |
| | | | | | | | Bupirimat | 28 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 28 | 1 | | | 0,024 | 0,1 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 28 | 1 | | | 0,02 | 0,3 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 28 | 7 | | | 0,39 | 5 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 28 | 1 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 28 | 3 | | | 0,29 | 10 |
| | | | | | | | Fenpyroximat | 28 | 2 | | | 0,01 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 28 | 8 | | | 0,28 | 4 |
| | | | | | | | Fluopyram | 28 | 19 | | | 0,27 | 2 |
| | | | | | | | Flutriafol | 28 | 1 | | | 0,034 | 1,5 |
| | | | | | | | Kresoxim-methyl | 28 | 2 | | | 0,11 | 1,5 |
| | | | | | | | Mepanipyrim | 28 | 5 | | | 0,31 | 3 |
| | | | | | | | Metrafenon | 28 | 1 | | | 0,051 | 0,6 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 28 | 1 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Penconazol | 28 | 4 | | | 0,033 | 0,5 |
| | | | | | | | Pirimicarb | 28 | 4 | | | 0,31 | 1,5 |
| | | | | | | | Propargit | 28 | | | 1 | 0,018 | 0,01 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 28 | 7 | | | 0,11 | 1,5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 28 | 1 | | | 0,17 | 5 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 28 | 3 | | | 0,018 | 0,3 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 28 | 1 | | | 0,053 | 1 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 28 | 1 | | | 0,019 | 0,1 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 28 | 14 | | | 0,13 | 1 |
| Kartoffel | DK | 26 | 21 | 7 | | | Chlorpropham | 26 | 4 | | | 2,6 | 10 |
| | | | | | | | Pencycuron | 26 | 1 | | | 0,011 | 0,1 |
| | | | | | | | Propamocarb | 26 | 2 | | | 0,011 | 0,3 |
| Kartoffel | UDL | 14 | 7 | 9 | | | Azoxystrobin | 14 | 1 | | | 0,005 | 7 |
| | | | | | | | Boscalid | 14 | 1 | | | 0,006 | 2 |
| | | | | | | | Chlorpropham | 14 | 3 | | | 0,069 | 10 |
| | | | | | | | Fluopicolid | 14 | 1 | | | 0,013 | 0,03 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Propamocarb | 14 | 2 | | | 0,016 | 0,3 |
| Kartoffel, ny | DK | 7 | 5 | 2 | | | Pencycuron | 7 | 2 | | | 0,017 | 0,1 |
| Kartoffel, ny | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Kastanie | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kinakål | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kinaradise | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kirsebær | DK | 1 | 0 | 1 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,019 | 4 |
| Kiwi | UDL | 28 | 17 | 15 | | | Deltamethrin | 28 | 1 | | | 0,013 | 0,15 |
| | | | | | | | Etofenprox | 28 | 1 | | | 0,022 | 1 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 28 | 4 | | | 0,54 | 15 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 28 | 9 | | | 1,5 | 15 |
| Kumquat | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kvæde | UDL | 1 | 0 | 3 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,024 | 0,8 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 1 | 1 | | | 0,049 | 0,2 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,2 |
| Kørvel | UDL | 1 | 0 | 11 | | | Abamectin (sum) | 1 | 1 | | | 0,008 | 2 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,023 | 3 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 1 | 1 | | | 0,015 | 70 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 1 | 1 | | | 0,029 | 40 |
| | | | | | | | Dicofol (sum) | 1 | 1 | | | 0,007 | 0,02 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 1 | 1 | | | 0,017 | 10 |
| | | | | | | | Emamectin | 1 | 1 | | | 0,1 | 1 |
| | | | | | | | Emamectin-benzoatB1b | 1 | 1 | | | 0,007 | |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 1 | 1 | | | 1,3 | 15 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,3 | 5 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,02 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Lime | UDL | 18 | 6 | 47 | 3 | 2 | Azoxystrobin | 18 | 6 | | | 0,032 | 15 |
| | | | | | | | Bifenthrin | 18 | 4 | 1 | 1 | 0,059 | 0,05 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 18 | 1 | | | 0,007 | 1,5 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 18 | 1 | | | 0,026 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 18 | 1 | | | 0,024 | 0,6 |
| | | | | | | | Etofenprox | 18 | 2 | | | 0,014 | 1,5 |
| | | | | | | | Fenpropathrin | 18 | 1 | | | 0,033 | 2 |
| | | | | | | | Imazalil | 18 | 10 | 2 | | 4,7 | 5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 18 | 1 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Malathion-Malaoxon (sum) | 18 | 2 | | | 0,038 | 2 |
| | | | | | | | Phosmet (sum) | 18 | 2 | | | 0,018 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 18 | 2 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 18 | 1 | | | 0,007 | 0,6 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 18 | 7 | | | 0,15 | 5 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 18 | 3 | | | 0,15 | 7 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 18 | | | 1 | 0,068 | 0,01 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 18 | 3 | | | 0,042 | 0,5 |
| Majroe | UDL | 1 | 0 | | 1 | | Cyhalothrin, lambda- | 1 | | 1 | | 0,024 | 0,04 |
| Majs | UDL | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| Mandarin, clementin | UDL | 36 | 1 | 106 | 3 | | 2-phenylphenol (sum) | 36 | 1 | | | 0,45 | 10 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 36 | 4 | | | 0,061 | 0,9 |
| | | | | | | | Boscalid | 36 | 1 | | | 0,005 | 2 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 36 | 1 | | | 0,01 | 0,7 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 36 | 1 | | | 0,034 | 0,7 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 36 | 1 | | | 0,034 | 1,5 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos-methyl | 36 | 1 | | | 0,028 | 2 |
| | | | | | | | Cyhalothrin, lambda- | 36 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Etofenprox | 36 | 4 | | | 0,1 | 1,5 |
| | | | | | | | Etoxazole | 36 | 2 | | | 0,028 | 0,1 |
| | | | | | | | Fenpyroximat | 36 | 1 | | | 0,014 | 0,5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 36 | 4 | | | 1,2 | 10 |
| | | | | | | | Hexythiazox | 36 | 5 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Imazalil | 36 | 31 | 3 | | 3,2 | 5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 36 | 2 | | | 0,028 | 1 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Phosmet (sum) | 36 | 1 | | | 0,012 | 0,5 |
| | | | | | | | Propiconazol | 36 | 5 | | | 0,92 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 36 | 4 | | | 0,014 | 2 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 36 | 17 | | | 2,4 | 8 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 36 | 7 | | | 0,059 | 0,6 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 36 | 11 | | | 3,1 | 7 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 36 | 1 | | | 0,005 | 0,5 |
| Mango | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Fludioxonil | 1 | 1 | | | 0,22 | 2 |
| Melon | UDL | 16 | 4 | 25 | | 1 | Acetamiprid | 16 | 2 | | | 0,023 | 0,2 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 16 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Boscalid | 16 | 1 | | | 0,024 | 3 |
| | | | | | | | Chlorantrani-liprol | 16 | 3 | | | 0,011 | 0,3 |
| | | | | | | | Cyromazin | 16 | 1 | | | 0,026 | 0,4 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 16 | 3 | | | 0,016 | 0,2 |
| | | | | | | | Etofenprox | 16 | | | 1 | 0,016 | 0,01 |
| | | | | | | | Fluopyram | 16 | 1 | | | 0,022 | 0,4 |
| | | | | | | | Flutriafol | 16 | 1 | | | 0,021 | 0,2 |
| | | | | | | | Imazalil | 16 | 4 | | | 0,6 | 2 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 16 | 4 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Propamocarb | 16 | 2 | | | 0,039 | 5 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 16 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 16 | 1 | | | 0,012 | 0,15 |
| Nektarin | UDL | 23 | 0 | 71 | | | Acetamiprid | 23 | 4 | | | 0,017 | 0,2 |
| | | | | | | | Boscalid | 23 | 7 | | | 0,066 | 5 |
| | | | | | | | Chlorantrani-liprol | 23 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 23 | 5 | | | 0,017 | 0,15 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 23 | 3 | | | 0,052 | 0,5 |
| | | | | | | | Etofenprox | 23 | 6 | | | 0,2 | 0,6 |
| | | | | | | | Fenbuconazol | 23 | 4 | | | 0,044 | 0,6 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 23 | 4 | | | 0,041 | 0,4 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 23 | 5 | | | 1,5 | 10 |
| | | | | | | | Fluopyram | 23 | 4 | | | 0,079 | 1,5 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 23 | 2 | | | 0,022 | 0,5 |
| | | | | | | | Penconazol | 23 | 1 | | | 0,018 | 0,15 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 23 | 5 | | | 0,014 | 0,3 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 23 | 5 | | | 0,013 | 0,6 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 23 | 10 | | | 0,098 | 0,6 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Thiacloprid | 23 | 2 | | | 0,085 | 0,5 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 23 | 3 | | | 0,047 | 3 |
| Pak choi, rød | DK | 1 | 0 | 2 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,021 | 9 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 1 | 1 | | | 0,006 | 1,5 |
| Papaya | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Bifenthrin | 1 | 1 | | | 0,021 | 0,4 |
| Pastinak | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pastinak | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Fluxapyroxad | 1 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| Peberfrugt | UDL | 48 | 10 | 66 | 1 | 2 | Acetamiprid | 48 | 1 | 1 | | 0,19 | 0,3 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 48 | 5 | | | 0,038 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 48 | 2 | | | 0,16 | 3 |
| | | | | | | | Buprofezin | 48 | | | 1 | 0,021 | 0,01 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 48 | 7 | | | 0,014 | 1 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 48 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 48 | 1 | | | 0,083 | 0,9 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 48 | 1 | | | 0,26 | 1 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 48 | 1 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 48 | 9 | | | 0,049 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 48 | 2 | | | 0,14 | 1 |
| | | | | | | | Fluopyram | 48 | 10 | | | 0,058 | 3 |
| | | | | | | | Flutriafol | 48 | 3 | | | 0,094 | 1-3 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 48 | 2 | | | 0,069 | 0,6 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 48 | 1 | | | 0,041 | 1 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 48 | 2 | | | 0,031 | 0,3 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 48 | 2 | | | 0,049 | 0,5 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 48 | 1 | | | 0,081 | |
| | | | | | | | Pirimicarb | 48 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Propamocarb | 48 | 8 | | | 0,094 | 3 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 48 | 2 | | | 0,068 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyridaben | 48 | | | 1 | 0,062 | 0,01 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 48 | 1 | | | 0,037 | 2 |
| | | | | | | | Spiromesifen | 48 | 2 | | | 0,11 | 0,5 |
| | | | | | | | Triadimenol | 48 | 1 | | | 0,039 | 0,1 |
| Peberrod | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Persille | UDL | 1 | 0 | 2 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,089 | 3 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 1 | 1 | | | 0,58 | 10 |
| Persille, bredbladet | UDL | 1 | 0 | 2 | | | Difenoconazol | 1 | 1 | | | 0,94 | 10 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal fund | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,024 | 5 |
| Pomelo | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Porre | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Purløg | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Purløg | UDL | 5 | 0 | 25 | 1 | 6 | Acetamiprid | 5 | 4 | | | 0,96 | 3 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 4 | 2 | | | 0,016 | 70 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 5 | 2 | | | 0,031 | 0,1 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 5 | 2 | | | 0,02 | 20 |
| | | | | | | | Clothianidin | 5 | 2 | 1 | | 1,4 | 1.5-20 |
| | | | | | | | Cyhalothrin, lambda- | 4 | | | 1 | 1,8 | 0,7 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 4 | 3 | | | 0,16 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 4 | 1 | | | 0,007 | 4 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 5 | 1 | | | 0,13 | 10 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 5 | 1 | | | 0,13 | 50 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 5 | 1 | | | 0,075 | 6 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 5 | 1 | | | 0,008 | 2 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 5 | 1 | | | 0,011 | 3 |
| | | | | | | | Methiocarb (sum) | 5 | 1 | | | 0,029 | 1 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 5 | | | 1 | 0,23 | 0,05 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 5 | 2 | | | 0,38 | 15 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 4 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Tebufenozid | 5 | | | 1 | 0,041 | 0,01 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 5 | | | 3 | 6,3 | 0,02 |
| Pære | DK | 15 | 5 | 17 | | | Boscalid | 15 | 6 | | | 0,095 | 1,5 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 15 | 3 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 15 | 1 | | | 0,005 | 0,8 |
| | | | | | | | Dithiocarbamater | 7 | 1 | | | 0,11 | 5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 15 | 3 | | | 0,042 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 15 | 3 | | | 0,012 | 0,5 |
| Pære | UDL | 23 | 0 | 65 | | | Acetamiprid | 23 | 1 | | | 0,025 | 0,4 |
| | | | | | | | Boscalid | 23 | 10 | | | 0,12 | 1,5 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 23 | 6 | | | 0,036 | 0,5 |
| | | | | | | | Chlormequatchlorid | 8 | 2 | | | 0,021 | 0,07 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 23 | 7 | | | 0,1 | 2 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal fund | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Difenoconazol | 23 | 2 | | | 0,005 | 0,8 |
| | | | | | | | Dithiocarbamater | 3 | 1 | | | 0,15 | 5 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 23 | 15 | | | 0,55 | 5 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 23 | 1 | | | 0,012 | 0,9 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 23 | 8 | | | 0,057 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 23 | 4 | | | 1,9 | 15 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 23 | 1 | | | 0,006 | 0,3 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 23 | 2 | | | 0,018 | 0,3 |
| | | | | | | | Tebufenozid | 23 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 23 | 1 | | | 0,34 | 4 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 23 | 3 | | | 0,016 | 0,3 |
| Rabarber | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Radise | DK | 4 | 2 | 2 | | | Fludioxonil | 4 | 2 | | | 0,006 | 0,3 |
| Radise | UDL | 10 | 2 | 10 | 1 | | Boscalid | 10 | 1 | | | 0,013 | 2 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 10 | 1 | | | 0,016 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 10 | 1 | | | 0,015 | 0,3 |
| | | | | | | | Fluopyram | 10 | 1 | | | 0,009 | 0,3 |
| | | | | | | | Propamocarb | 10 | 5 | 1 | | 1,7 | 3 |
| | | | | | | | Tolclofos-methyl | 10 | 1 | | | 0,028 | 0,1 |
| Ribs | UDL | 1 | 0 | 5 | 1 | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,025 | 2 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 1 | | 1 | | 0,085 | 0,1 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 1 | 1 | | | 0,075 | 0,2 |
| | | | | | | | Tetraconazol | 1 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,017 | 1 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 1 | 1 | | | 0,005 | 3 |
| Ruccola | UDL | 4 | 1 | 6 | | | Boscalid | 4 | 1 | | | 3,5 | 50 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 4 | 1 | | | 0,014 | 2 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 4 | 2 | | | 0,017 | 25 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 4 | 1 | | | 0,22 | 10 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 4 | 1 | | | 0,028 | 10 |
| Rødbede | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rødbede-blade | DK | 1 | 0 | 3 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,087 | 50 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 1 | 1 | | | 0,74 | 25 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 1 | 1 | | | 0,011 | 10 |
| Salat | DK | 3 | 1 | 5 | 1 | | Boscalid | 3 | 2 | | | 16 | 50 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal fund | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Indoxacarb | 3 | 1 | | | 1,2 | 3 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 3 | 2 | | | 0,81 | 25 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 3 | | 1 | | 1,7 | 2 |
| Salat | UDL | 10 | 2 | 20 | 1 | 1 | Boscalid | 10 | 2 | | | 11 | 50 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 10 | 3 | | | 1,2 | 20 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 10 | 2 | | | 0,042 | 0.5-2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 10 | 1 | | | 0,008 | 4 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 10 | 1 | | | 0,022 | 15 |
| | | | | | | | Emamectin | 10 | 1 | | | 0,007 | 1 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 10 | 1 | | | 0,01 | 40 |
| | | | | | | | Fluopyram | 10 | 1 | | | 0,005 | 15 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 10 | 3 | | | 3,9 | 25 |
| | | | | | | | Propamocarb | 10 | 1 | | | 0,23 | 30 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 10 | 1 | | 1 | 2,2 | 2 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 10 | 2 | | | 0,16 | 10 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 10 | | 1 | | 0,008 | 0,01 |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 10 | 1 | | | 0,013 | 0,1 |
| Salat, iceberg | DK | 4 | 3 | 2 | | | Boscalid | 4 | 1 | | | 0,32 | 50 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 4 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| Salat, iceberg | UDL | 9 | 6 | 3 | | | Cyprodinil | 9 | 1 | | | 0,01 | 15 |
| | | | | | | | Propamocarb | 9 | 2 | | | 0,008 | 40 |
| Salat, spæde blade | DK | 1 | 0 | 2 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,007 | 50 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 1 | 1 | | | 0,14 | 10 |
| Scorzonerrod | UDL | 1 | 0 | 2 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,015 | 2 |
| | | | | | | | Fluopyram | 1 | 1 | | | 0,017 | 0,3 |
| Selleri | DK | 3 | 1 | 2 | | | Aclonifen | 3 | 2 | | | 0,009 | 0,3 |
| Selleri | UDL | 7 | 1 | 12 | | | Azoxystrobin | 7 | 2 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Chlorpropham | 7 | 1 | | | 0,025 | 0,05 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 7 | 1 | | | 0,027 | 0,3 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 7 | 4 | | | 0,02 | 2 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 7 | 1 | | | 0,03 | 0,2 |
| | | | | | | | Fluopyram | 7 | 2 | | | 0,014 | 0,3 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 7 | 1 | | | 0,007 | 0,05 |
| Slangeagurk | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Spidskål | UDL | 3 | 2 | 1 | | | Propamocarb | 3 | 1 | | | 0,008 | 0,7 |
| Spinat | DK | 5 | 2 | 4 | | | Boscalid | 5 | 1 | | | 0,014 | 50 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 5 | 3 | | | 0,29 | 25 |
| Spinat | UDL | 10 | 6 | 8 | | | Acetamiprid | 10 | 1 | | | 0,13 | 0,6 |
| | | | | | | | Boscalid | 10 | 1 | | | 0,87 | 50 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 10 | 1 | | | 0,35 | 20 |
| | | | | | | | Cyfluthrin | 10 | 1 | | | 0,071 | 1 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 10 | 1 | | | 0,22 | 25 |
| | | | | | | | Phenmedipham | 10 | 1 | | | 0,014 | 0,3 |
| | | | | | | | Propamocarb | 10 | 1 | | | 12 | 40 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 10 | 1 | | | 0,03 | 0,6 |
| Sød kartoffel | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Te | UDL | 17 | 15 | 5 | | | Flufenoxuron | 17 | 1 | | | 0,04 | 15 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 17 | 1 | | | 0,027 | 15 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 17 | 1 | | | 0,046 | 10 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 17 | 2 | | | 0,11 | 20 |
| Te, frugt | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Te, urte | UDL | 1 | 0 | 1 | | 5 | Ametoctradin | 1 | | | 1 | 0,4 | 0,01 |
| | | | | | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,77 | 3 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 1 | | | 1 | 0,37 | 0,05 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 1 | | | 1 | 0,99 | 0,05 |
| | | | | | | | Metrafenon | 1 | | | 1 | 1,1 | 0,05 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 1 | | | 1 | 0,19 | 0,1 |
| Tomat | DK | 19 | 18 | 1 | | | Metrafenon | 19 | 1 | | | 0,016 | 0,6 |
| Tomat | UDL | 24 | 11 | 25 | | | Acetamiprid | 24 | 1 | | | 0,013 | 0,5 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 24 | 2 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 24 | 4 | | | 0,087 | 3 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 24 | 1 | | | 0,02 | 0,6 |
| | | | | | | | Cyazofamid | 24 | 1 | | | 0,072 | 0,6 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 24 | 1 | | | 0,026 | 1,5 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 24 | 1 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Famoxadon | 24 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Fluopyram | 24 | 7 | | | 0,052 | 0,9 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 24 | 1 | | | 0,046 | 0,3 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 24 | 2 | | | 0,031 | 0,3 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 24 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 24 | 1 | | | 0,01 | 0,9 |
| | | | | | | | Tebufenpyrad | 24 | 1 | | | 0,33 | 0,8 |
| Vandmelon | UDL | 5 | 2 | 5 | | | Difenoconazol | 5 | 1 | | | 0,006 | 0,2 |
| | | | | | | | Etoxazole | 5 | 1 | | | 0,014 | 0,05 |
| | | | | | | | Fluopicolid | 5 | 1 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 5 | 1 | | | 0,02 | 0,2 |
| | | | | | | | Propamocarb | 5 | 1 | | | 0,013 | 5 |
| Vindrue | UDL | 40 | 3 | 112 | 1 | 1 | Abamectin (sum) | 40 | | 1 | | 0,009 | 0,01 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 40 | 4 | | | 0,19 | 0,5 |
| | | | | | | | Ametoctradin | 40 | 4 | | | 0,079 | 6 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 40 | 2 | | | 0,34 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 40 | 5 | | | 1,2 | 5 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 40 | | | 1 | 0,027 | 0,01 |
| | | | | | | | Clothianidin | 40 | 1 | | | 0,018 | 0,7 |
| | | | | | | | Cyazofamid | 40 | 3 | | | 0,084 | 2 |
| | | | | | | | Cyfluthrin | 40 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 40 | 3 | | | 0,73 | 3 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 40 | 1 | | | 0,017 | 0,2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 40 | 5 | | | 0,11 | 3 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 40 | 15 | | | 0,56 | 3 |
| | | | | | | | Emamectin | 40 | 2 | | | 0,022 | 0,05 |
| | | | | | | | Emamectin-benzoatB1b | 27 | 1 | | | 0,001 | |
| | | | | | | | Famoxadon | 40 | 1 | | | 0,005 | 2 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 40 | 6 | | | 0,31 | 15 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 40 | 3 | | | 0,59 | 5 |
| | | | | | | | Fluopicolid | 40 | 2 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Fluopyram | 40 | 11 | | | 0,39 | 1,5 |
| | | | | | | | Fluvalinat, tau- | 40 | 1 | | | 0,012 | 1 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 40 | 6 | | | 0,38 | 1.5-3 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 40 | 2 | | | 0,019 | 1 |
| | | | | | | | Kresoxim-methyl | 40 | 1 | | | 0,12 | 1,5 |
| | | | | | | | Mandipropa-mid | 40 | 2 | | | 0,013 | 2 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 40 | 6 | | | 0,72 | 2 |
| | | | | | | | Metrafenon | 40 | 3 | | | 0,16 | 7 |
| | | | | | | | Myclobutanil | 40 | 2 | | | 0,017 | 1 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| | | | | | | | Penconazol | 40 | 7 | | | 0,087 | 0,5 |
| | | | | | | | Proquinazid | 40 | 1 | | | 0,011 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 40 | 1 | | | 0,19 | 5 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 40 | 2 | | | 0,016 | 0,5 |
| | | | | | | | Spiroxamin | 40 | 2 | | | 0,026 | 0,6 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 40 | 1 | | | 0,006 | 0,5 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 40 | 4 | | | 0,32 | 3 |
| | | | | | | | Zoxamid | 40 | 1 | | | 0,011 | 5 |
| Æble | DK | 22 | 6 | 32 | | | Boscalid | 22 | 13 | | | 0,28 | 2 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 22 | 2 | | | 0,08 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 22 | 1 | | | 0,006 | 0,8 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 22 | 2 | | | 0,007 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 22 | 2 | | | 0,044 | 5 |
| | | | | | | | Hexythiazox | 22 | 1 | | | 0,018 | 1 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 22 | 2 | | | 0,025 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 22 | 9 | | | 0,064 | 0,5 |
| Æble | UDL | 28 | 4 | 59 | | | Acetamiprid | 28 | 11 | | | 0,14 | 0,4 |
| | | | | | | | Boscalid | 28 | 6 | | | 0,053 | 2 |
| | | | | | | | Bupirimat | 28 | 1 | | | 0,028 | 0,2 |
| | | | | | | | Chlorantrani-liprol | 28 | 3 | | | 0,023 | 0,5 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 28 | 2 | | | 0,084 | 2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 28 | 1 | | | 0,008 | 0,8 |
| | | | | | | | Ethirimol | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,1 |
| | | | | | | | Etofenprox | 28 | 1 | | | 0,017 | 0,7 |
| | | | | | | | Fenoxycarb | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,7 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,3 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 28 | 10 | | | 0,29 | 5 |
| | | | | | | | Fluopyram | 28 | 1 | | | 0,031 | 0,6 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 28 | 1 | | | 0,015 | 0,9 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 28 | 1 | | | 0,016 | 0,5 |
| | | | | | | | Pirimicarb | 28 | 3 | | | 0,068 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 28 | 1 | | | 0,036 | 0,5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 28 | 5 | | | 4,1 | 15 |
| | | | | | | | Spirodiclofen | 25 | 2 | | | 0,031 | 0,8 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 28 | 1 | | | 0,017 | 0,3 |
| | | | | | | | Tebufenozid | 28 | 1 | | | 0,029 | 1 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 28 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) Antal prøver: Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Antal fund: Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) Antal prøver analyseret | Antal fund: Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Thiacloprid | 28 | 1 | | | 0,013 | 0,3 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 28 | 3 | | | 0,03 | 0,7 |
| Ærter med bælg | DK | 10 | 8 | 4 | | | Azoxystrobin | 10 | 1 | | | 0,015 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 10 | 2 | | | 0,061 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 10 | 1 | | | 0,011 | 0,6 |
| Ærter med bælg | UDL | 11 | 2 | 16 | 1 | 2 | Acetamiprid | 11 | 1 | | | 0,018 | 0,6 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 11 | 4 | | | 0,048 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 11 | 1 | | | 0,033 | 5 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 11 | | | 1 | 1 | 0,2 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 11 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Deltamethrin | 11 | 1 | | | 0,046 | 0,2 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 11 | 2 | | | 0,02 | 1 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 11 | 1 | | | 0,021 | 1 |
| | | | | | | | Fluopyram | 11 | 1 | | | 0,04 | 1,5 |
| | | | | | | | Flutriafol | 11 | | 1 | | 0,009 | 0,01 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 11 | 1 | | | 0,008 | 5 |
| | | | | | | | Omethoat | 11 | | | 1 | 0,015 | 0,01 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 11 | 1 | | | 0,006 | 0,6 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 11 | 1 | | | 0,051 | 0,3 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 11 | 1 | | | 0,02 | 2 |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | DK | 197 | 119 | 146 | 1 | 1 | | | 146 | 1 | 1 | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | UDL | 700 | 206 | 1320 | 34 | 28 | | | 1320 | 34 | 28 | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | I alt | 897 | 325 | 1466 | 35 | 29 | | | 1466 | 35 | 29 | | |
| **Korn, ris og majs (cerealier, konventionelt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Boghvede | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bygkerner | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bygkerner | UDL | 2 | 0 | 2 | | | Chlormequatchlorid | 1 | 1 | | | 0,012 | 3 |
| | | | | | | | Piperonylbutoxid | 2 | 1 | | | 0,04 | |
| Durummel | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Havregryn | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Havregryn | UDL | 5 | 3 | 4 | | | Chlormequatchlorid | 4 | 2 | | | 3,5 | 15 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Glyphosat | 4 | 2 | | | 0,11 | 20 |
| Havrekerner | DK | 5 | 1 | 5 | | | Boscalid | 5 | 1 | | | 0,02 | 4 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 5 | 2 | | | 0,025 | |
| | | | | | | | Tebuconazol | 5 | 2 | | | 0,014 | 2 |
| Havrekerner | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Havreklid | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvede, durum, kerner | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvedekerner | DK | 20 | 12 | 9 | | | Boscalid | 18 | 3 | | | 0,047 | 0,8 |
| | | | | | | | Chlormequatchlorid | 16 | 1 | | | 0,13 | 7 |
| | | | | | | | Fluopyram | 18 | 2 | | | 0,014 | 0,9 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 14 | 3 | | | 0,02 | |
| Hvedekerner | UDL | 7 | 4 | 3 | | | Piperonyl-butoxid | 4 | 1 | | | 0,028 | |
| | | | | | | | Pirimiphos-methyl | 6 | 1 | | | 0,013 | 5 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 6 | 1 | | | 0,011 | 0,3 |
| Hvedemel | DK | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Hvedemel | UDL | 10 | 0 | 10 | | | Chlormequatchlorid | 10 | 10 | | | 0,075 | 7 |
| Hvedemel, fuldkorn | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Majsgryn | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Majsmel | UDL | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Ris | UDL | 19 | 9 | 17 | 2 | 4 | Acetamiprid | 19 | | | 1 | 0,017 | 0,01 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 19 | 1 | | | 0,032 | 5 |
| | | | | | | | Bromid | 9 | 4 | | | 9,9 | 50 |
| | | | | | | | Buprofezin | 19 | | | 1 | 0,014 | 0,005 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 19 | | | 1 | 0,028 | 0,01 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 19 | 1 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Flutriafol | 19 | 1 | | | 0,013 | 1,5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 19 | 1 | | | 0,044 | 1,5 |
| | | | | | | | Isoprothiolan | 19 | 2 | | | 0,42 | 3-6 |
| | | | | | | | Permethrin (sum) | 19 | | 1 | | 0,026 | 0,05 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 18 | 4 | | | 6 | |
| | | | | | | | Tebuconazol | 19 | 3 | | | 0,052 | 0.75-1.5 |
| | | | | | | | Triazophos | 19 | | 1 | | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | | Tricyclazol | 19 | | | 1 | 0,013 | 0,005 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Ris, brune | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ris, grødris | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Piperonyl-butoxid | 2 | 1 | | | 0,013 | |
| Ris, parboiled | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Azoxystrobin | 2 | 1 | | | 0,027 | 5 |
| Ris, sorte | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rugkerner | DK | 23 | 23 | | | | | | | | | | |
| Speltmel | DK | 1 | 0 | 2 | | | Chlormequatchlorid | 1 | 1 | | | 0,24 | 7 |
| | | | | | | | Mepiquatchlorid | 1 | 1 | | | 0,029 | 3 |
| Speltmel | UDL | 6 | 0 | 7 | | | Chlormequatchlorid | 6 | 6 | | | 0,11 | 7 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 3 | 1 | | | 0,013 | |
| Ølandshvede | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum cerealier | DK | 63 | 50 | 16 | | | | | 16 | | | | |
| Sum cerealier | UDL | 66 | 31 | 45 | 2 | 4 | | | 45 | 2 | 4 | | |
| Sum cerealier | I alt | 129 | 81 | 61 | 2 | 4 | | | 61 | 2 | 4 | | |
| **Forarbejdede fødevarer af frugt og grøntsager (konventionelt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Abrikos, tørret | UDL | 1 | 0 | 3 | | | Carbendazim og benomyl | 1 | 1 | | | 0,014 | 0,68 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 1 | 1 | | | 0,019 | 6,8 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,006 | 1,7 |
| Bordvin, hvidvin | UDL | 10 | 5 | 8 | | | Boscalid | 10 | 3 | | | 0,022 | 6,5 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 10 | 1 | | | 0,006 | 19,5 |
| | | | | | | | Iprovalicarb | 10 | 3 | | | 0,015 | 2,6 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 10 | 1 | | | 0,005 | 1,3 |
| Bordvin, rosévin | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bordvin, rødvin | UDL | 33 | 10 | 45 | | | Boscalid | 33 | 5 | | | 0,009 | 6,5 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 33 | 13 | | | 0,043 | 3,9 |
| | | | | | | | Fenhexamid | 33 | 8 | | | 0,12 | 19,5 |
| | | | | | | | Fluopicolid | 33 | 2 | | | 0,023 | 2,6 |
| | | | | | | | Fluopyram | 33 | 1 | | | 0,006 | 1,95 |
| | | | | | | | Fluxapyroxad | 33 | 1 | | | 0,005 | 3,9 |
| | | | | | | | Iprovalicarb | 33 | 1 | | | 0,043 | 2,6 |
| | | | | | | | Mandipropamid | 33 | 1 | | | 0,007 | 2,6 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal fund | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Metalaxyl | 33 | 12 | | | 0,071 | 1,3 |
| | | | | | | | Tebufenozid | 33 | 1 | | | 0,011 | 5,2 |
| Figen, tørret | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Jordbær, tørret | UDL | 1 | 0 | 4 | | | Fludioxonil | 1 | 1 | | | 0,28 | 4 |
| | | | | | | | Fluopyram | 1 | 1 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,075 | 1 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 1 | 1 | | | 0,067 | 1 |
| Melonkerner | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sveske | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Æble, tørret | UDL | 1 | 0 | 4 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,034 | 0,4 |
| | | | | | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,026 | 2 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 1 | 1 | | | 0,045 | 0,2 |
| | | | | | | | Triflumuron | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager | UDL | 52 | 21 | 64 | | | | | 64 | | | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager | I alt | 52 | 21 | 64 | | | | | 64 | | | | |
| **Forarbejdede fødevarer af cerealier (konventionelt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Bulgur, kogt og kølet | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Cornflakes | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Cornflakes | UDL | 6 | 4 | 3 | | | Piperonyl-butoxid | 4 | 2 | | | 0,059 | |
| | | | | | | | Pirimiphos-methyl | 6 | 1 | | | 0,015 | 0,5 |
| Pasta, tørret | UDL | 11 | 5 | 11 | | | Glyphosat | 1 | 1 | | | 0,07 | 20 |
| | | | | | | | Piperonyl-butoxid | 9 | 5 | | | 0,079 | |
| | | | | | | | Pirimiphos-methyl | 11 | 5 | | | 0,093 | 5 |
| Sum forarbejdede cerealier | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier | UDL | 18 | 10 | 14 | | | | | 14 | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier | I alt | 22 | 14 | 14 | | | | | 14 | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| **Babymad (konventionelt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Modermælkserstatning | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Modermælkserstatning | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum babymad | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Sum babymad | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum babymad | I alt | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| **Animalske fødevarer (konventionelt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Honning | DK | 29 | 26 | 3 | | | Thiacloprid | 29 | 3 | | | 0,059 | 0,2 |
| Honning, lyng- | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum honning | DK | 30 | 27 | 3 | | | | | 3 | | | | |
| Sum honning | I alt | 30 | 27 | 3 | | | | | 3 | | | | |
| Fedt, kylling | DK | 27 | 27 | | | | | | | | | | |
| Fårekød | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Hest, kød | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Hjortekød, opdrættet | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Kanin | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kvæglever | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Lammekød | UDL | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| Mælk, rå | DK | 21 | 21 | | | | | | | | | | |
| Mælkepulver | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Mælkepulver | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Oksekød | UDL | 18 | 18 | | | | | | | | | | |
| Okselever | DK | 23 | 23 | | | | | | | | | | |
| Pangasius | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Rejer | UDL | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Rejer, kogte | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Rejer, kogte, pillede | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rejer, tiger | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Rejer, varmtvands-, kogte | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Sandart, fillet | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Svinekød | DK | 51 | 51 | | | | | | | | | | |
| Æg | DK | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| Æg, tørret | UDL | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| Ørred, dambrug | DK | 17 | 17 | | | | | | | | | | |
| Ørred, havbrug | DK | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| Ål | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum animalske fødevarer (incl.forarb., excl. honning) | DK | 181 | 181 | | | | | | | | | | |
| Sum animalske fødevarer (incl.forarb., excl. honning) | UDL | 70 | 70 | | | | | | | | | | |
| Sum animalske fødevarer (incl.forarb., excl. honning) | I alt | 251 | 251 | | | | | | | | | | |
| **Økologisk frugt og grønt** | | | | | | | | | | | | | |
| Abrikos (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Agurk (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ananas (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Appelsin (økologisk) | UDL | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| Asparges, grønne (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Aubergine (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bergamot, orange (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Blomkål (økologisk) | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Blomkål (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Blomme (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Blåbær (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Broccoli (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Citrongræs (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Glaskål (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Grønkål (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Gulerod (økologisk) | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Gulerod (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Jordbær (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Kaki (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kartoffel (økologisk) | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Kartoffel (økologisk) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Kartoffel, ny (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kikærter, tørre (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kiwi (økologisk) | UDL | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| Lime (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Løg (økologisk) | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Løg (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Mango (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Nektarin (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pak choi (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Persille (økologisk) | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Spinosad (sum) | 1 | 1 | | | 0,014 | 60 |
| Persille, bredbladet (økologisk) | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Spinosad (sum) | 1 | 1 | | | 0,34 | 60 |
| Porre (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pære (økologisk) | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Pære (økologisk) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Rødbede (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rødkål (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Salat (økologisk) | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Salat (økologisk) | UDL | 2 | 1 | 2 | | | Azadirachtin | 2 | 1 | | | 0,046 | 1 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 2 | 1 | | | 0,12 | 10 |
| Salat, iceberg (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Salat, iceberg (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Savoykål (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Skalotteløg (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Spidskål (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Spidskål (økologisk) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Spinat (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Te (økologisk) | UDL | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Tomat (økologisk) | UDL | 5 | 4 | 1 | | | Spinosad (sum) | 5 | 1 | | | 0,03 | 0,7 |
| Vindrue (økologisk) | UDL | 6 | 5 | 1 | | | Spinosad (sum) | 6 | 1 | | | 0,009 | 0,5 |
| Æble (økologisk) | UDL | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | DK | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | UDL | 76 | 71 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | I alt | 100 | 95 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| **Økologiske korn, ris, mel (cerealier)** | | | | | | | | | | | | | |
| Chiafrø (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Havregryn (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Havregryn (økologisk) | UDL | 3 | 1 | 2 | | | Chlormequatchlorid | 3 | 2 | | | 0,035 | 15 |
| Havrekerner (økologisk) | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Havrekerner (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Hvedekerner (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvedekerner (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvedemel (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvedemel (økologisk) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Hvedemel, fuldkorn (økologisk) | DK | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Quinoa (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ris (økologisk) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Ris, sorte (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Rugflager (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rugkerner (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rugmel (økologisk) | DK | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Rugmel, fuldkorn (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Spelt, kerner (økologisk) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Speltmel (økologisk) | DK | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Speltmel (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ølandshvede (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum cerealier(økologiske) | DK | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| Sum cerealier(økologiske) | UDL | 24 | 22 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Sum cerealier(økologiske) | I alt | 40 | 38 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| **Økologisk forarbejdede vegetabilske fødevarer** | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Bordvin, rødvin (økologisk) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager (økologiske) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager (økologiske) | I alt | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Havre, kerner, afskallede (økologisk) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier (økologiske) | DK | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier (økologiske) | I alt | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| **Økologisk animalske fødevarer** | | | | | | | | | | | | | |
| Æg (økologisk) | DK | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Sum animalske fødevarer (økologiske) | DK | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Sum animalske fødevarer (økologiske) | I alt | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Sum konventionelt | DK | 477 | 383 | 165 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Sum konventionelt | UDL | 907 | 339 | 1443 | 36 | 32 | | | | | | | |
| Sum økologisk | DK | 46 | 46 | | | | | | | | | | |
| Sum økologisk | UDL | 104 | 97 | 8 | | | | | | | | | |
| Sum stikprøver i alt | I alt | 1534 | 865 | 1616 | 37 | 33 | | | 1616 | 37 | 33 | | |

## Bilag 2.2 National mistankekontrol. Import af prøver udtaget i lufthavnen og prøver udtaget af rejseholdet (Målrettet prøvetagning)

| Produkt | Oprindelse | (pr. produktog oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Agurk | UDL | 1 | 0 | 4 | 4 | | Carbendazim og benomyl | 1 | | 1 | | 0,076 | 0,1 |
| | | | | | | | Cymoxanil | 1 | 1 | | | 0,014 | 0,08 |
| | | | | | | | Cyprodinil | 1 | | 1 | | 0,28 | 0,5 |
| | | | | | | | Famoxadon | 1 | | 1 | | 0,15 | 0,2 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 1 | 1 | | | 0,1 | 0,4 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 1 | 1 | | | 0,024 | 0,5 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 1 | 1 | | | 0,07 | 0,5 |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 1 | | 1 | | 0,1 | 0,1 |
| Aubergine | UDL | 4 | 0 | 6 | | 3 | Acephat | 4 | | | 1 | 0,032 | 0,01 |
| | | | | | | | Acetamiprid | 4 | 3 | | | 0,072 | 0,2 |
| | | | | | | | Ethion | 4 | | | 1 | 0,07 | 0,01 |
| | | | | | | | Flonicamid (sum) | 4 | 1 | | | 0,034 | 0,5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 4 | 1 | | | 0,011 | 0,5 |
| | | | | | | | Omethoat | 4 | | | 1 | 0,12 | 0,01 |
| | | | | | | | Pyridaben | 4 | 1 | | | 0,013 | 0,15 |
| Babymajs | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Banan | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bananblomst | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bitteragurk | UDL | 2 | 0 | 6 | | 2 | Carbendazim og benomyl | 2 | 1 | | | 0,012 | 0,1 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 2 | 1 | | | 0,017 | 0,2 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 2 | 1 | | | 0,008 | 1 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 2 | | | 1 | 0,028 | 0,01 |
| | | | | | | | Profenofos | 2 | | | 1 | 0,028 | 0,01 |
| | | | | | | | Pymetrozin | 2 | 1 | | | 0,008 | 1 |
| | | | | | | | Spirodiclofen | 2 | 1 | | | 0,005 | 0,02 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 2 | 1 | | | 0,007 | 0,5 |
| Bladselleri | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Blomst, Sesbania | UDL | 1 | 0 | 3 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,064 | 3 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 1 | 1 | | | 0,17 | 2 |
| | | | | | | | Profenofos | 1 | 1 | | | 0,014 | 0,05 |
| Broccoli | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Cinidon-ethyl | 2 | 1 | | | 0,021 | 1 |
| Bønner med bælg | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Cha om | UDL | 2 | 0 | 2 | | | Azadirachtin | 2 | 1 | | | 0,13 | 1 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 2 | 1 | | | 0,012 | 0,05 |
| Citrongræs | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produktog oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Dild | UDL | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | Carbofuran (sum) | 2 | | | 1 | 0,048 | 0,02 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 2 | | | 1 | 0,2 | 0,01 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 2 | 1 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Cyproconazol | 2 | | | 1 | 0,12 | 0,05 |
| | | | | | | | Profenofos | 2 | | | 1 | 0,088 | 0,05 |
| | | | | | | | Propiconazol | 2 | | | 1 | 0,44 | 0,02 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 2 | | 1 | | 1,3 | 2 |
| Dragefrugt | UDL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fluxapyroxad | 1 | | | 1 | 0,014 | 0,01 |
| | | | | | | | Iprodion | 1 | | | 1 | 0,11 | 0,01 |
| | | | | | | | Permethrin (sum) | 1 | | 1 | | 0,027 | 0,05 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 1 | | | 1 | 0,027 | 0,02 |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 1 | 1 | | | 0,049 | 0,1 |
| Forårsløg | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Galangarod, tørret | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Gurkemeje | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Hellig Basilikum | UDL | 3 | 0 | 5 | | 1 | Abamectin (sum) | 3 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 3 | | | 1 | 0,12 | 0,02 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 3 | 2 | | | 0,043 | 10 |
| | | | | | | | Emamectin | 3 | 1 | | | 0,025 | 1 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 3 | 1 | | | 0,036 | 2 |
| Hvidløg, blade, frisk | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvidløg, frosne | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Javaingefær | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Kailankål | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Chlorantraniliprol | 2 | 1 | | | 0,005 | 1 |
| Katost, blade, friske | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kokosflager | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Koriander, frisk | UDL | 4 | 2 | 2 | | 2 | Azoxystrobin | 4 | 1 | | | 0,009 | 70 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 4 | | | 1 | 0,011 | 0,01 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 4 | 1 | | | 0,005 | 2 |
| | | | | | | | Mepanipyrim | 4 | | | 1 | 0,025 | 0,02 |
| Krydderurt | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Limeblade | UDL | 1 | 0 | 1 | | 1 | Chlorpyrifos | 1 | | | 1 | 0,034 | 0,02 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 1 | 1 | | | 0,052 | 2 |
| Mango | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Meterbønne | UDL | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | Acephat | 3 | | | 1 | 0,074 | 0,01 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 3 | 1 | | | 0,087 | 3 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 3 | 2 | | | 0,027 | 0,8 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 3 | 2 | | | 0,25 | 0,7 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produktog oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Dimethomorph | 3 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Methamidophos | 3 | | | 1 | 0,011 | 0,01 |
| Okra | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Papaya | UDL | 4 | 3 | 1 | | | Cypermethrin | 4 | 1 | | | 0,005 | 0,5 |
| Persille | UDL | 1 | 0 | 5 | | | Azoxystrobin | 1 | 1 | | | 0,014 | 70 |
| | | | | | | | Cyhalothrin, lambda- | 1 | 1 | | | 0,24 | 0,7 |
| | | | | | | | Fluopyram | 1 | 1 | | | 0,34 | 8 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 1 | 1 | | | 0,19 | 2 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 1 | 1 | | | 0,16 | 15 |
| Selleriblade | UDL | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | Acetamiprid | 2 | 1 | | | 0,047 | 3 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 2 | 2 | | | 8,3 | 70 |
| | | | | | | | Bifenthrin | 2 | | | 1 | 0,024 | 0,02 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 2 | 2 | | | 1,1 | 20 |
| | | | | | | | Chlorfenapyr | 2 | | | 1 | 1 | 0,02 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 2 | | 1 | 1 | 0,031 | 0.01-0.02 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 2 | 1 | | | 0,51 | 10 |
| | | | | | | | Emamectin | 2 | 1 | | | 0,0088 | 1 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 2 | | 1 | | 1,2 | 2 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 2 | 1 | | | 0,2 | 3 |
| | | | | | | | Omethoat | 2 | | | 1 | 2,4 | 0,02 |
| | | | | | | | Pentachlorthioanisol | 2 | 1 | | | 0,013 | |
| | | | | | | | Quintozen (sum) | 2 | | | 1 | 3,2 | 0,05 |
| | | | | | | | Tecnazen | 2 | | | 1 | 0,031 | 0,02 |
| Skruepalme | UDL | 1 | 0 | 1 | | 2 | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,041 | 3 |
| | | | | | | | Chlorfenapyr | 1 | | | 1 | 0,61 | 0,02 |
| | | | | | | | Pyridaben | 1 | | | 1 | 0,46 | 0,02 |
| Squash | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Svampe, dyrkede | UDL | 1 | 0 | | 1 | 2 | Chlorpyrifos | 1 | | | 1 | 0,046 | 0,01 |
| | | | | | | | Dimethoat | 1 | | | 1 | 0,043 | 0,01 |
| | | | | | | | Omethoat | 1 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| Sød Basilikum | UDL | 4 | | 10 | | 3 | Bifenthrin | 4 | 1 | | | 0,009 | 0,02 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 4 | | | 1 | 0,4 | 0,1 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 4 | 2 | | | 0,47 | 20 |
| | | | | | | | Clethodim (sum) | 4 | 2 | | | 0,022 | 0,5 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 4 | 1 | | | 0,59 | 2 |
| | | | | | | | Dimethomorph | 4 | 2 | | | 0,45 | 10 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produktog oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Emamectin | 4 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Metalaxyl | 4 | 1 | | | 0,024 | 3 |
| | | | | | | | Pyridaben | 4 | | | 1 | 0,073 | 0,02 |
| | | | | | | | Triazophos | 4 | | | 1 | 1,5 | 0,01 |
| Tamarind blade | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Vandspinat | UDL | 6 | 3 | 2 | 1 | | Azoxystrobin | 6 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 6 | 2 | | | 0,041 | 20 |
| Ærter med bælg | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | UDL | 79 | 42 | 66 | 11 | 32 | | | 66 | 11 | 32 | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | I alt | 79 | 42 | 66 | 11 | 32 | | | 66 | 11 | 32 | | |
| Babymajs (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Citrongræs (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | I alt | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Sum konventionelt | UDL | 79 | 42 | 66 | 11 | 32 | | | | | | | |
| Sum økologisk | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Sum stikprøver i alt | I alt | 82 | 45 | 66 | 11 | 32 | | | 66 | 11 | 32 | | |

## Bilag 2.3 Kontrol af import af økologiske produkter fra Ukraine, Kazakhstan og Rusland m.fl. (EU-koordineret kontrol)

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Bønne, edamame m. bælg (økologisk) | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Bønne, edamame u. bælg (økologisk) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Græskarkerner (økologisk) | UDL | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| Solsikkekerne (økologisk) | UDL | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | UDL | 26 | 26 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | I alt | 26 | 26 | | | | | | | | | | |
| Sum økologisk | UDL | 26 | 26 | | | | | | | | | | |
| Sum stikprøver i alt | I alt | 26 | 26 | | | | | | | | | | |

## Bilag 2.4 Kontrolkampagne 2020

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkdt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | Antal prøver analyseret | Antal fund | | | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | |
| Abrikos, kerner | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Appelsin | UDL | 3 | 0 | 9 | 1 | | Imazalil | 3 | 2 | 1 | | 2,5 | 4 |
| | | | | | | | Malathion-Malaoxon (sum) | 3 | 1 | | | 0,03 | 2 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 3 | 1 | | | 0,064 | 2 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 3 | 2 | | | 2,7 | 8 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 3 | 3 | | | 2,2 | 7 |
| Aubergine | UDL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Acetamiprid | 3 | 1 | | | 0,013 | 0,2 |
| | | | | | | | Diflubenzuron | 3 | | 1 | | 0,007 | 0,01 |
| | | | | | | | Dimethoat | 3 | | | 1 | 0,044 | 0,01 |
| | | | | | | | Omethoat | 3 | | | 2 | 0,027 | 0,01 |
| Basilikum, frisk | UDL | 1 | 0 | 5 | | | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,058 | 3 |
| | | | | | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,021 | 50 |
| | | | | | | | Emamectin | 1 | 1 | | | 0,011 | 1 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 1 | 1 | | | 0,006 | 2 |
| | | | | | | | Spinosad (sum) | 1 | 1 | | | 0,0039 | 15 |
| Blomme, frosne | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, edamame m. bælg | UDL | 1 | | 1 | | | Cyfluthrin | 1 | 1 | | | 0,027 | 0,1 |
| Bønne, heste | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, hvid | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Bønne, mung | UDL | 1 | | | | 2 | Hexaconazol | 1 | | | 1 | 0,016 | 0,01 |
| | | | | | | | Triazophos | 1 | | | 1 | 0,027 | 0,01 |
| Bønne, sort | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Citron | UDL | 2 | | 6 | 1 | | Imazalil | 2 | 1 | 1 | | 4,3 | 5 |
| | | | | | | | Propiconazol | 2 | 1 | | | 1,1 | 5 |
| | | | | | | | Pyraclostrobin | 2 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Thiabendazol | 2 | 2 | | | 1,9 | 7 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 2 | 1 | | | 0,012 | 0,5 |
| Daddel | UDL | 1 | | | | 3 | Carbendazim og benomyl | 1 | | | 1 | 1,1 | 0,1 |
| | | | | | | | Propamocarb | 1 | | | 1 | 0,36 | 0,01 |
| | | | | | | | Thiophanat-methyl | 1 | | | 1 | 0,33 | 0,1 |
| Durianfrugt | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Figen, frisk | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Græskar, frosne | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvidløg | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hvidløg, frosne | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Hyben | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Jordbær | UDL | 2 | | 2 | | 1 | Acetamiprid | 2 | 1 | | | 0,007 | 0,5 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkdt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Chlorpropham | 2 | | | 1 | 0,018 | 0,01 |
| | | | | | | | Penconazol | 2 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| Kaffebønne, grøn | UDL | 11 | 10 | 2 | | | Clothianidin | 11 | 1 | | | 0,012 | 0,05 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 11 | 1 | | | 0,02 | 0,2 |
| Kikærter, frosne | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Koriander, frisk | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Thiamethoxam | 1 | 1 | | | 0,016 | 0,05 |
| Makok, blade | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Mandel | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Melon | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Muskatblomme | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Pære | UDL | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | Abamectin (sum) | 1 | | 1 | | 0,019 | 0,03 |
| | | | | | | | Diflubenzuron | 1 | | | 1 | 0,011 | 0,01 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 1 | 1 | | | 0,088 | 15 |
| | | | | | | | Pyriproxyfen | 1 | 1 | | | 0,096 | 0,2 |
| | | | | | | | Spirodiclofen | 1 | 1 | | | 0,1 | 0,8 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,3 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | | 1 | | 0,28 | 0,3 |
| Rambutan | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sød Basilikum | UDL | 1 | 0 | 4 | | 1 | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,006 | 3 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 1 | 1 | | | 0,015 | 20 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 1 | | | 1 | 0,44 | 0,02 |
| | | | | | | | Propanil | 1 | 1 | | | 0,007 | 0,02 |
| | | | | | | | Thiacloprid | 1 | 1 | | | 0,017 | 5 |
| Sød kartoffel | UDL | 1 | 0 | 2 | | | Fludioxonil | 1 | 1 | | | 0,45 | 10 |
| | | | | | | | Piperonylbutoxid | 1 | 1 | | | 0,027 | |
| Te | UDL | 5 | 4 | 1 | | | Thiacloprid | 5 | 1 | | | 0,035 | 10 |
| Timian | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Imidacloprid | 1 | 1 | | | 0,027 | 2 |
| Æble | UDL | 2 | 0 | 6 | | | Acetamiprid | 2 | 1 | | | 0,022 | 0,4 |
| | | | | | | | Chlorantraniliprol | 2 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 2 | 1 | | | 0,007 | 0,8 |
| | | | | | | | Fludioxonil | 2 | 2 | | | 0,48 | 5 |
| | | | | | | | Pyrimethanil | 2 | 1 | | | 1,5 | 15 |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | UDL | 55 | 33 | 45 | 5 | 11 | | | 45 | 5 | 11 | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | I alt | 55 | 33 | 45 | 5 | 11 | | | 45 | 5 | 11 | | |
| Hvedemel | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Pirimiphos-methyl | 1 | 1 | | | 0,029 | 5 |
| Majs, tørret | UDL | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Quinoa | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ris | UDL | 12 | 4 | 20 | | 14 | Acetamiprid | 12 | | | 3 | 0,016 | 0,01 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 12 | 2 | | | 0,022 | 5 |
| | | | | | | | Buprofezin | 12 | | | 1 | 0,021 | 0,01 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 12 | | | 2 | 0,04 | 0,01 |
| | | | | | | | Difenoconazol | 12 | 1 | | | 0,021 | 3 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 12 | 3 | | | 0,07 | 1,5 |
| | | | | | | | Isoprothiolan | 12 | 2 | | | 0,075 | 6 |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkdt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Malathion-Malaoxon (sum) | 12 | 2 | | | 0,31 | 8 |
| | | | | | | | Profenofos | 12 | | | 1 | 0,015 | 0,01 |
| | | | | | | | Propiconazol | 12 | 4 | | | 0,017 | 1,5 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 12 | 6 | | | 0,082 | 1,5 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 12 | | | 3 | 0,033 | 0,01 |
| | | | | | | | Triazophos | 12 | | | 1 | 0,027 | 0,02 |
| | | | | | | | Tricyclazol | 12 | | | 3 | 0,087 | 0,01 |
| Ris, brune | UDL | 2 | 1 | | | 1 | Profenofos | 2 | | | 1 | 0,019 | 0,01 |
| Ris, røde | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum cerealier | UDL | 19 | 9 | 21 | | 15 | | | 21 | | 15 | | |
| Sum cerealier | I alt | 19 | 9 | 21 | | 15 | | | 21 | | 15 | | |
| Abrikos, tørret | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Trifloxystrobin | 2 | 1 | | | 0,012 | 10,4 |
| Blåbær, tørret | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Fludioxonil | 1 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| Bukkehornsblade, tørret | UDL | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Acetamiprid | 1 | 1 | | | 0,13 | 30 |
| | | | | | | | Azoxystrobin | 1 | 1 | | | 0,056 | 700 |
| | | | | | | | Carbendazim og benomyl | 1 | 1 | | | 0,08 | 1 |
| | | | | | | | Chlorpyrifos | 1 | | | 1 | 0,79 | 0,2 |
| | | | | | | | Phorat (sum) | 1 | | 1 | | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | Tebuconazol | 1 | 1 | | | 0,34 | 20 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 1 | | 1 | | 0,16 | 0,2 |
| | | | | | | | Tricyclazol | 1 | | | 1 | 0,26 | 0,2 |
| Daddel, tørret | UDL | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Hvidløg, tørret | UDL | 1 | 0 | | 1 | | Clothianidin | 1 | | 1 | | 0,007 | 0,01 |
| Kaffebønne, ristet | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Paprika | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Chlorantraniliprol | 1 | 1 | | | 0,03 | 10 |
| Rosin | UDL | 2 | 1 | 4 | | | Azoxystrobin | 2 | 1 | | | 0,009 | 16,8 |
| | | | | | | | Bifenthrin | 2 | 1 | | | 0,013 | 1,68 |
| | | | | | | | Fenpyroximat | 2 | 1 | | | 0,034 | 1,68 |
| | | | | | | | Trifloxystrobin | 2 | 1 | | | 0,006 | 16,8 |
| Svampe, uspecifik, tørret | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Tomat, tørret, marineret | UDL | 1 | 0 | 1 | | | Boscalid | 1 | 1 | | | 0,009 | 3 |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager | UDL | 14 | 7 | 12 | 3 | 2 | | | 12 | 3 | 2 | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager | I alt | 14 | 7 | 12 | 3 | 2 | | | 12 | 3 | 2 | | |
| Nudel | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede cerealier | I alt | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Havtornebær (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kaffebønne, grøn (økologisk) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | UDL | 5 | 5 | | | | | | | | | | |

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkdt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. (økologiske) | I alt | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Abrikos, tørret (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Daddel, tørret (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Figen, tørret (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Rosin (økologisk) | UDL | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager (økologiske) | UDL | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum forarbejdede frugt og grøntsager (økologiske) | I alt | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Sum konventionelt | UDL | 89 | 50 | 78 | 8 | 28 | | | | | | | |
| Sum økologisk | UDL | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| Sum stikprøver i alt | I alt | 98 | 59 | 78 | 8 | 28 | | | 78 | 8 | 28 | | |

## Bilag 2.5 EU-koordineret mistankekontrol, forordning 2019/1793

| Produkt | Oprindelse | (pr. produkt og oprindelse) | | | | | Påvist stof | (pr. produkt, oprindelse og stof) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund | | | | | Antal fund | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Uden påviste pesticidrester | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Bønner med bælg | UDL | 2 | 1 | 1 | | | Azoxystrobin | 1 | 1 | | | 0,008 | 3 |
| Chili | UDL | 4 | 2 | 5 | | | Azoxystrobin | 3 | 1 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Cypermethrin | 3 | 1 | | | 0,08 | 0,5 |
| | | | | | | | Imidacloprid | 4 | 2 | | | 0,072 | 1 |
| | | | | | | | Indoxacarb | 4 | 1 | | | 0,024 | 0,3 |
| Sesamfrø | UDL | 2 | 2 | | | | Ethylenoxid[a] | | | | | | |
| Te | UDL | 3 | 1 | 3 | | | Clothianidin | 3 | 1 | | | 0,026 | 0,7 |
| | | | | | | | Flufenoxuron | 3 | 1 | | | 0,083 | 15 |
| | | | | | | | Thiamethoxam | 3 | 1 | | | 0,53 | 20 |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | UDL | 11 | 6 | 9 | | | | | 9 | | | | |
| Sum frugt, grøntsager o.l. | I alt | 11 | 6 | 9 | | | | | 9 | | | | |
| Sum konventionelt | UDL | 11 | 6 | 9 | | | | | | | | | |
| Sum stikprøver i alt | I alt | 11 | 6 | 9 | | | | | 9 | | | | |

a) Ud over det almindelige analyseprogram, er disse prøver også analyseret for ethylenoxid. Ethylenoxid blev ikke påvist.

**Bilag 3**

## Påviste pesticider i kontrollen, 2020

Tabellens venstre side viser alle de stoffer, der blev påvist (det samlede antal stoffer i undersøgelsesprogrammet fremgår af bilag 1). Antallet af stikprøver, der blev undersøgt for stoffet er angivet, samt antallet af prøver, hvor stoffet ikke blev påvist. Der er også angivet hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester, der var for hver kombination af stof og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien).

Tabellens højre side viser de produkter, hvor stoffet blev påvist (for hver kombination af stof og oprindelse). Her er angivet, hvor mange prøver af det pågældende produkt, der blev analyseret for stoffet, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve, der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende produkt/stof kombination.

Tabellen inkluderer ikke prøver udtaget som mistankeprøver.

Forkortelser:
DK: Dansk produceret;
UDL: Udenlandsk produceret;
MRL: Gældende maksimalgrænseværdi.

Kun stoffer og afgrøder med mindst én påvisning er vist i tabellen (bilag 1 viser alle stoffer (restdefinitioner) i kontrolprogrammet).

| | | (pr. stof og oprindelse) | | | | | | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| Påvist stof | Oprindelse | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Produkt | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | MRL (mg/kg) |
| 2-phenylphenol (sum) | UDL | 865 | 851 | 14 | | | Appelsin | 43 | 10 | | | 4,9 | 10 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 3 | | | 4,9 | 10 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,45 | 10 |
| 2,4-D (sum) | UDL | 68 | 67 | 1 | | | Appelsin | 10 | 1 | | | 0,13 | 1 |
| Abamectin (sum) | UDL | 914 | 912 | 1 | 1 | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,008 | 2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | | 1 | | 0,009 | 0,01 |
| Acetamiprid | UDL | 940 | 883 | 52 | 3 | 2 | Agurk | 25 | 3 | | | 0,07 | 0,3 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 4 | | | 0,04 | 0,9 |
| | | | | | | | Bladbede | 1 | 1 | | | 0,074 | 3 |
| | | | | | | | Blåbær | 4 | 2 | | | 0,029 | 2 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | 1 | | 0,17 | 0,3 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,009 | 0,9 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Granatæble | 18 | | 1 | 1 | 0,011 | 0,01 |
| | | | | | | | Kvæde | 1 | 1 | | | 0,024 | 0,8 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,023 | 3 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 4 | | | 0,061 | 0,9 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 2 | | | 0,023 | 0,2 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | Antal fund af stof | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 4 | | | 0,017 | 0,2 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | 1 | | 0,19 | 0,3 |
| | | | | | | | Persille | 1 | 1 | | | 0,089 | 3 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 4 | | | 0,96 | 3 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 1 | | | 0,025 | 0,4 |
| | | | | | | | Ribs | 1 | 1 | | | 0,025 | 2 |
| | | | | | | | Ris | 19 | | | 1 | 0,017 | 0,01 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,13 | 0,6 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,013 | 0,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 4 | | | 0,19 | 0,5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 11 | | | 0,14 | 0,4 |
| | | | | | | | Æble, tørret | 1 | 1 | | | 0,034 | 0,4 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,018 | 0,6 |
| Aclonifen | DK | 364 | 362 | 2 | | | Selleri | 3 | 2 | | | 0,009 | 0,3 |
| Aclonifen | UDL | 880 | 879 | 1 | | | Gulerod | 19 | 1 | | | 0,007 | 0,08 |
| Ametoctradin | UDL | 914 | 906 | 7 | | 1 | Agurk | 25 | 3 | | | 0,025 | 2 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | | | 1 | 0,4 | 0,01 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 4 | | | 0,079 | 6 |
| Azadirachtin | UDL | 707 | 706 | 1 | | | Salat (økologisk) | 2 | 1 | | | 0,046 | 1 |
| Azoxystrobin | DK | 364 | 359 | 5 | | | Gulerod | 24 | 2 | | | 0,008 | 1 |
| | | | | | | | Jordbær | 17 | 2 | | | 0,071 | 10 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 10 | 1 | | | 0,015 | 3 |
| Azoxystrobin | UDL | 880 | 824 | 56 | | | Agurk | 25 | 2 | | | 0,021 | 1 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 2 | | | 0,02 | 15 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 10 | | | 0,47 | 2 |
| | | | | | | | Bladselleri | 1 | 1 | | | 0,005 | 15 |
| | | | | | | | Blomme | 17 | 1 | | | 0,01 | 2 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 1 | | | 0,012 | 5 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 3 | | | 0,18 | 3 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 3 | | | 0,07 | 15 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 3 | | | 0,031 | 1 |
| | | | | | | | Hindbær | 2 | 2 | | | 0,02 | 5 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 1 | | | 0,005 | 7 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,015 | 70 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 6 | | | 0,032 | 15 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 5 | | | 0,038 | 3 |
| | | | | | | | Purløg | 4 | 2 | | | 0,016 | 70 |
| | | | | | | | Ris | 19 | 1 | | | 0,032 | 5 |
| | | | | | | | Ris, parboiled | 2 | 1 | | | 0,027 | 5 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 2 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 2 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,34 | 3 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 4 | | | 0,048 | 3 |
| Bifenthrin | UDL | 935 | 924 | 9 | 1 | 1 | Banan | 14 | 4 | | | 0,023 | 0,1 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 4 | 1 | 1 | 0,059 | 0,05 |
| | | | | | | | Papaya | 1 | 1 | | | 0,021 | 0,4 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | Antal fund af stof | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Boscalid | DK | 329 | 284 | 45 | | | Bladbede | 2 | 2 | | | 0,061 | 50 |
| | | | | | | | Gulerod | 24 | 1 | | | 0,098 | 2 |
| | | | | | | | Havrekerner | 5 | 1 | | | 0,02 | 4 |
| | | | | | | | Hvedekerner | 18 | 3 | | | 0,047 | 0,8 |
| | | | | | | | Jordbær | 17 | 9 | | | 0,067 | 6 |
| | | | | | | | Kirsebær | 1 | 1 | | | 0,019 | 4 |
| | | | | | | | Pak choi, rød | 1 | 1 | | | 0,021 | 9 |
| | | | | | | | Pære | 15 | 6 | | | 0,095 | 1,5 |
| | | | | | | | Rødbedeblade | 1 | 1 | | | 0,087 | 50 |
| | | | | | | | Salat | 3 | 2 | | | 16 | 50 |
| | | | | | | | Salat, iceberg | 4 | 1 | | | 0,32 | 50 |
| | | | | | | | Salat, spæde blade | 1 | 1 | | | 0,0067 | 50 |
| | | | | | | | Spinat | 5 | 1 | | | 0,014 | 50 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 13 | | | 0,28 | 2 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 10 | 2 | | | 0,061 | 5 |
| Boscalid | UDL | 940 | 849 | 91 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,007 | 4 |
| | | | | | | | Bladbede | 1 | 1 | | | 0,036 | 50 |
| | | | | | | | Blomme | 17 | 7 | | | 0,12 | 3 |
| | | | | | | | Blåbær | 4 | 2 | | | 0,049 | 15 |
| | | | | | | | Bordvin, hvidvin | 10 | 3 | | | 0,022 | 6,5 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 5 | | | 0,009 | 6,5 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 3 | | | 0,38 | 10 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 2 | | | 0,077 | 5 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 2 | | | 0,069 | 5 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 5 | | | 0,016 | 2 |
| | | | | | | | Hindbær | 2 | 2 | | | 0,046 | 10 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 11 | | | 0,47 | 6 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 1 | | | 0,006 | 2 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,005 | 2 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,024 | 3 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 7 | | | 0,066 | 5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,16 | 3 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 10 | | | 0,12 | 1,5 |
| | | | | | | | Radise | 10 | 1 | | | 0,013 | 2 |
| | | | | | | | Ruccola | 4 | 1 | | | 3,5 | 50 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 2 | | | 11 | 50 |
| | | | | | | | Scorzonerrod | 1 | 1 | | | 0,015 | 2 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,87 | 50 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | 1 | | | 0,77 | 3 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 4 | | | 0,087 | 3 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 5 | | | 1,2 | 5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 6 | | | 0,053 | 2 |
| | | | | | | | Æble, tørret | 1 | 1 | | | 0,026 | 2 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,033 | 5 |
| Bromid | UDL | 12 | 8 | 4 | | | Ris | 9 | 4 | | | 9,9 | 50 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Bupirimat | UDL | 940 | 938 | 2 | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,028 | 0,2 |
| Buprofezin | UDL | 940 | 936 | | 1 | 3 | Appelsin | 43 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Chili | 14 | | | 1 | 0,021 | 0,01 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | | | 1 | 0,021 | 0,01 |
| | | | | | | | Ris | 19 | | | 1 | 0,014 | 0,005 |
| Carbendazim og benomyl | UDL | 940 | 921 | 16 | 1 | 2 | Abrikos, tørret | 1 | 1 | | | 0,014 | 0,68 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 6 | | | 0,05 | 0,2 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,016 | 0,7 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,2 |
| | | | | | | | Figen, frisk | 8 | 1 | | | 0,013 | 0,1 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,024 | 0,1 |
| | | | | | | | Kvæde | 1 | 1 | | | 0,049 | 0,2 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,01 | 0,7 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 2 | | | 0,031 | 0,1 |
| | | | | | | | Ribs | 1 | | 1 | | 0,085 | 0,1 |
| | | | | | | | Ris | 19 | | | 1 | 0,028 | 0,01 |
| | | | | | | | Æble, tørret | 1 | 1 | | | 0,045 | 0,2 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | | | 1 | 1 | 0,2 |
| Chlorantraniliprol | UDL | 940 | 907 | 33 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,008 | 0,3 |
| | | | | | | | Bladbede | 1 | 1 | | | 0,0055 | 20 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 2 | | | 0,083 | 1 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,006 | 1 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,034 | 0,7 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 3 | | | 0,011 | 0,3 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 7 | | | 0,014 | 1 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 2 | | | 0,02 | 20 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 6 | | | 0,036 | 0,5 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 3 | | | 1,2 | 20 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,35 | 20 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,02 | 0,6 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 3 | | | 0,023 | 0,5 |
| Chlormequatchlorid | DK | 82 | 80 | 2 | | | Hvedekerner | 16 | 1 | | | 0,13 | 7 |
| | | | | | | | Speltmel | 1 | 1 | | | 0,24 | 7 |
| Chlormequatchlorid | UDL | 78 | 55 | 23 | | | Bygkerner | 1 | 1 | | | 0,012 | 3 |
| | | | | | | | Havregryn (økologisk) | 3 | 2 | | | 0,035 | 15 |
| | | | | | | | Havregryn | 4 | 2 | | | 3,5 | 15 |
| | | | | | | | Hvedemel | 10 | 10 | | | 0,075 | 7 |
| | | | | | | | Pære | 8 | 2 | | | 0,021 | 0,07 |
| | | | | | | | Speltmel | 6 | 6 | | | 0,11 | 7 |
| Chlorpropham | DK | 326 | 322 | 4 | | | Kartoffel | 26 | 4 | | | 2,6 | 10 |
| Chlorpropham | UDL | 865 | 860 | 4 | 1 | | Appelsin | 43 | | 1 | | 0,006 | 0,01 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 3 | | | 0,069 | 10 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 1 | | | 0,025 | 0,05 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Chlorpyrifos | UDL | 935 | 923 | 10 | | 2 | Appelsin | 43 | 5 | | | 0,024 | 1,5 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 1 | | | 0,023 | 4 |
| | | | | | | | Bønne, tørret | 1 | | | 1 | 0,061 | 0,01 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,035 | 1,5 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,02 | 0,3 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,007 | 1,5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,034 | 1,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | | | 1 | 0,027 | 0,01 |
| Chlorpyrifos-methyl | UDL | 828 | 827 | 1 | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,028 | 2 |
| Cinidon-ethyl | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Bønner med bælg | 15 | 1 | | | 0,03 | 0,8 |
| Clothianidin | UDL | 914 | 909 | 3 | 1 | 1 | Chili | 14 | | | 1 | 0,047 | 0,04 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 2 | 1 | | 1,4 | 1.5-20 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,018 | 0,7 |
| Cyazofamid | UDL | 914 | 907 | 7 | | | Agurk | 25 | 3 | | | 0,047 | 0,2 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,072 | 0,6 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 3 | | | 0,084 | 2 |
| Cyfluthrin | UDL | 935 | 931 | 3 | 1 | | Blomme | 17 | 1 | | | 0,007 | 0,2 |
| | | | | | | | Citron | 17 | | 1 | | 0,016 | 0,02 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,071 | 1 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| Cyhalothrin, lambda- | UDL | 793 | 790 | 1 | 1 | 1 | Majroe | 1 | | 1 | | 0,024 | 0,04 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Purløg | 4 | | | 1 | 1,8 | 0,7 |
| Cypermethrin | UDL | 935 | 930 | 5 | | | Abrikos, tørret | 1 | 1 | | | 0,019 | 6,8 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 2 | | | 0,046 | 2 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,037 | 2 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,026 | 2 |
| Cyprodinil | DK | 326 | 312 | 14 | | | Agurk | 15 | 3 | | | 0,027 | 0,5 |
| | | | | | | | Jordbær | 17 | 6 | | | 0,46 | 5 |
| | | | | | | | Pære | 15 | 3 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 2 | | | 0,08 | 2 |
| Cyprodinil | UDL | 865 | 825 | 40 | | | Agurk | 25 | 7 | | | 0,09 | 0,5 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 2 | | | 0,28 | 3 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 2 | | | 0,11 | 2 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,26 | 1,5 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 2 | | | 0,039 | 2 |
| | | | | | | | Hindbær | 2 | 1 | | | 0,14 | 3 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 7 | | | 0,39 | 5 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,029 | 40 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 7 | | | 0,1 | 2 |
| | | | | | | | Radise | 10 | 1 | | | 0,016 | 0,3 |
| | | | | | | | Salat, iceberg | 9 | 1 | | | 0,01 | 15 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 1 | | | 0,027 | 0,3 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,026 | 1,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 3 | | | 0,73 | 3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 2 | | | 0,084 | 2 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,019 | 2 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | Antal fund af stof | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Cyromazin | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,026 | 0,4 |
| Deltamethrin | UDL | 935 | 916 | 19 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 3 | | | 0,023 | 0,15 |
| | | | | | | | Kiwi | 28 | 1 | | | 0,013 | 0,15 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 5 | | | 0,017 | 0,15 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Purløg | 4 | 3 | | | 0,16 | 2 |
| | | | | | | | Ruccola | 4 | 1 | | | 0,014 | 2 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 2 | | | 0,042 | 0.5-2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,017 | 0,2 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,046 | 0,2 |
| Dicofol (sum) | UDL | 880 | 879 | 1 | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,007 | 0,02 |
| Difenoconazol | DK | 364 | 362 | 2 | | | Pære | 15 | 1 | | | 0,005 | 0,8 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 1 | | | 0,006 | 0,8 |
| Difenoconazol | UDL | 880 | 840 | 40 | | | Bladselleri | 1 | 1 | | | 0,007 | 7 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 2 | | | 0,042 | 1 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,013 | 0,9 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 3 | | | 0,022 | 0,5 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 1 | | | 0,012 | 0,4 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,017 | 10 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,024 | 0,6 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 3 | | | 0,016 | 0,2 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 3 | | | 0,052 | 0,5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,083 | 0,9 |
| | | | | | | | Persille | 1 | 1 | | | 0,58 | 10 |
| | | | | | | | Persille, bredbladet | 1 | 1 | | | 0,94 | 10 |
| | | | | | | | Purløg | 4 | 1 | | | 0,007 | 4 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 2 | | | 0,005 | 0,8 |
| | | | | | | | Ribs | 1 | 1 | | | 0,075 | 0,2 |
| | | | | | | | Ris | 19 | 1 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,008 | 4 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 4 | | | 0,02 | 2 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Vandmelon | 5 | 1 | | | 0,006 | 0,2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 5 | | | 0,11 | 3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,008 | 0,8 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 2 | | | 0,02 | 1 |
| Dimethomorph | UDL | 914 | 881 | 32 | | 1 | Agurk | 25 | 1 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 13 | | | 0,043 | 3,9 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,26 | 1 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,13 | 10 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,022 | 15 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | | | 1 | 0,37 | 0,05 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 15 | | | 0,56 | 3 |
| Dithiocarbamater | DK | 39 | 38 | 1 | | | Pære | 7 | 1 | | | 0,11 | 5 |
| Dithiocarbamater | UDL | 52 | 48 | 4 | | | Appelsin | 12 | 3 | | | 0,48 | 5 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Pære | 3 | 1 | | | 0,15 | 5 |
| Emamectin | UDL | 914 | 910 | 4 | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,1 | 1 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,007 | 1 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,022 | 0,05 |
| Emamectinbenzo-atB1b | UDL | 707 | 705 | 2 | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,007 | 0 |
| | | | | | | | Vindrue | 27 | 1 | | | 0,001 | 0 |
| Ethirimol | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,1 |
| Etofenprox | UDL | 880 | 860 | 16 | 2 | 2 | Blomme | 17 | | 2 | 1 | 0,057 | 0,01 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,009 | 1,5 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,032 | 0,6 |
| | | | | | | | Kiwi | 28 | 1 | | | 0,022 | 1 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 2 | | | 0,014 | 1,5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 4 | | | 0,1 | 1,5 |
| | | | | | | | Melon | 16 | | | 1 | 0,016 | 0,01 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 6 | | | 0,2 | 0,6 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,017 | 0,7 |
| Etoxazole | UDL | 914 | 911 | 3 | | | Mandarin, clementin | 36 | 2 | | | 0,028 | 0,1 |
| | | | | | | | Vandmelon | 5 | 1 | | | 0,014 | 0,05 |
| Famoxadon | UDL | 914 | 912 | 2 | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,0051 | 2 |
| Fenazaquin | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,062 | 0,2 |
| Fenbuconazol | UDL | 880 | 873 | 7 | | | Fersken | 14 | 3 | | | 0,048 | 0,6 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 4 | | | 0,044 | 0,6 |
| Fenhexamid | DK | 329 | 328 | 1 | | | Jordbær | 17 | 1 | | | 0,015 | 10 |
| Fenhexamid | UDL | 940 | 914 | 26 | | | Blåbær | 4 | 1 | | | 0,13 | 20 |
| | | | | | | | Bordvin, hvidvin | 10 | 1 | | | 0,006 | 19,5 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 8 | | | 0,12 | 19,5 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 1 | | | 0,042 | 15 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 3 | | | 0,29 | 10 |
| | | | | | | | Kiwi | 28 | 4 | | | 0,54 | 15 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,013 | 3 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,13 | 50 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 6 | | | 0,31 | 15 |
| Fenoxycarb | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,7 |
| Fenpropathrin | UDL | 880 | 879 | 1 | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,033 | 2 |
| Fenpropimorph | UDL | 865 | 863 | 2 | | | Banan | 14 | 2 | | | 0,005 | 0,6 |
| Fenpyroximat | UDL | 914 | 909 | 5 | | | Appelsin | 43 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 2 | | | 0,01 | 0,3 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,014 | 0,5 |
| Flonicamid (sum) | DK | 329 | 327 | 2 | | | Æble | 22 | 2 | | | 0,007 | 0,3 |
| Flonicamid (sum) | UDL | 940 | 919 | 21 | | | Agurk | 25 | 3 | | | 0,03 | 0,5 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 2 | | | 0,035 | 0,4 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 4 | | | 0,041 | 0,4 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 9 | | | 0,049 | 0,3 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,075 | 6 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,006 | 0,3 |
| Fludioxonil | DK | 326 | 309 | 17 | | | Jordbær | 17 | 10 | | | 0,48 | 4 |
| | | | | | | | Pære | 15 | 3 | | | 0,042 | 5 |
| | | | | | | | Radise | 4 | 2 | | | 0,006 | 0,3 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 2 | | | 0,044 | 5 |
| Fludioxonil | UDL | 865 | 769 | 96 | | | Agurk | 25 | 5 | | | 0,025 | 0,4 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 3 | | | 0,61 | 10 |
| | | | | | | | Blomme | 17 | 5 | | | 0,98 | 5 |
| | | | | | | | Blåbær | 4 | 1 | | | 0,057 | 2 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 2 | | | 0,21 | 5 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,29 | 1 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 3 | | | 0,056 | 10 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 5 | | | 0,41 | 10 |
| | | | | | | | Granatæble | 18 | 5 | | | 0,098 | 3 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 2 | | | 0,01 | 1 |
| | | | | | | | Hindbær | 2 | 1 | | | 0,11 | 5 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 8 | | | 0,28 | 4 |
| | | | | | | | Jordbær, tørret | 1 | 1 | | | 0,28 | 4 |
| | | | | | | | Kiwi | 28 | 9 | | | 1,5 | 15 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 4 | | | 1,2 | 10 |
| | | | | | | | Mango | 1 | 1 | | | 0,22 | 2 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 5 | | | 1,5 | 10 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,14 | 1 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 15 | | | 0,55 | 5 |
| | | | | | | | Radise | 10 | 1 | | | 0,015 | 0,3 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,01 | 40 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 1 | | | 0,03 | 0,2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 3 | | | 0,59 | 5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 10 | | | 0,29 | 5 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,021 | 1 |
| Flufenoxuron | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Te | 17 | 1 | | | 0,04 | 15 |
| Fluopicolid | UDL | 914 | 904 | 10 | | | Agurk | 25 | 4 | | | 0,038 | 0,5 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 2 | | | 0,023 | 2,6 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 1 | | | 0,013 | 0,03 |
| | | | | | | | Vandmelon | 5 | 1 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,019 | 2 |
| Fluopyram | DK | 296 | 294 | 2 | | | Hvedekerner | 18 | 2 | | | 0,014 | 0,9 |
| Fluopyram | UDL | 940 | 858 | 82 | | | Agurk | 25 | 6 | | | 0,053 | 0,5 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 1 | | | 0,006 | 1,95 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 5 | | | 0,067 | 1 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 4 | | | 0,045 | 3 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 5 | | | 0,27 | 1,5 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 1 | | | 0,005 | 0,4 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 19 | | | 0,27 | 2 |
| | | | | | | | Jordbær, tørret | 1 | 1 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,022 | 0,4 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | Antal fund af stof | | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 4 | | | 0,079 | 1,5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 10 | | | 0,058 | 3 |
| | | | | | | | Radise | 10 | 1 | | | 0,009 | 0,3 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,005 | 15 |
| | | | | | | | Scorzonerrod | 1 | 1 | | | 0,017 | 0,3 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 2 | | | 0,014 | 0,3 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 7 | | | 0,052 | 0,9 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 11 | | | 0,39 | 1,5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,031 | 0,6 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,04 | 1,5 |
| Flutriafol | UDL | 955 | 946 | 8 | 1 | | Chili | 14 | 2 | | | 0,28 | 1 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,034 | 1,5 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,021 | 0,2 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 3 | | | 0,094 | 1-3 |
| | | | | | | | Ris | 19 | 1 | | | 0,013 | 1,5 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | | 1 | | 0,009 | 0,01 |
| Fluvalinat, tau- | UDL | 880 | 878 | 2 | | | Appelsin | 43 | 1 | | | 0,019 | 0,4 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,012 | 1 |
| Fluxapyroxad | UDL | 940 | 925 | 15 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,0066 | 0,2 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 1 | | | 0,005 | 3,9 |
| | | | | | | | Gulerod | 19 | 2 | | | 0,013 | 0,3 |
| | | | | | | | Pastinak | 1 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,069 | 0,6 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 1 | | | 0,012 | 0,9 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 6 | | | 0,38 | 1.5-3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,015 | 0,9 |
| Glyphosat | UDL | 122 | 118 | 3 | 1 | | Bønne, hvid | 2 | | 1 | | 2 | 2 |
| | | | | | | | Havregryn | 4 | 2 | | | 0,11 | 20 |
| | | | | | | | Pasta, tørret | 1 | 1 | | | 0,07 | 20 |
| Hexythiazox | DK | 329 | 327 | 2 | | | Jordbær | 17 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 1 | | | 0,018 | 1 |
| Hexythiazox | UDL | 940 | 925 | 15 | | | Appelsin | 43 | 7 | | | 0,044 | 1 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 3 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 5 | | | 0,015 | 1 |
| Imazalil | UDL | 940 | 832 | 93 | 14 | 1 | Appelsin | 43 | 36 | 5 | 1 | 5,6 | 4-5 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 2 | | | 0,2 | 2 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 10 | 4 | | 3,6 | 5 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 10 | 2 | | 4,7 | 5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 31 | 3 | | 3,2 | 5 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 4 | | | 0,6 | 2 |
| Imidacloprid | UDL | 940 | 915 | 25 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Appelsin | 43 | 3 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 1 | | | 0,009 | 2 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,13 | 1 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 2 | | | 0,021 | 1 |
| | | | | | | | Granatæble | 18 | 2 | | | 0,03 | 1 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,016 | 1 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 2 | | | 0,028 | 1 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 4 | | | 0,02 | 0,5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,041 | 1 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,008 | 2 |
| | | | | | | | Ris | 19 | 1 | | | 0,044 | 1,5 |
| | | | | | | | Vandmelon | 5 | 1 | | | 0,02 | 0,2 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,019 | 1 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,008 | 5 |
| Indoxacarb | DK | 308 | 305 | 3 | | | Salat | 3 | 1 | | | 1,2 | 3 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 2 | | | 0,025 | 0,5 |
| Indoxacarb | UDL | 914 | 908 | 6 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 2 | | | 0,063 | 0,3 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,031 | 0,3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,016 | 0,5 |
| Iprovalicarb | UDL | 940 | 936 | 4 | | | Bordvin, hvidvin | 10 | 3 | | | 0,015 | 2,6 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 1 | | | 0,043 | 2,6 |
| Isoprothiolan | UDL | 865 | 863 | 2 | | | Ris | 19 | 2 | | | 0,42 | 3-6 |
| Kresoxim-methyl | UDL | 865 | 862 | 3 | | | Jordbær | 28 | 2 | | | 0,11 | 1,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,12 | 1,5 |
| Malathion-Malaoxon (sum) | UDL | 940 | 936 | 4 | | | Appelsin | 43 | 2 | | | 0,017 | 2 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 2 | | | 0,038 | 2 |
| Mandipropamid | DK | 329 | 320 | 9 | | | Bladbede | 2 | 2 | | | 0,17 | 25 |
| | | | | | | | Rødbedeblade | 1 | 1 | | | 0,74 | 25 |
| | | | | | | | Salat | 3 | 2 | | | 0,81 | 25 |
| | | | | | | | Salat, spæde blade | 1 | 1 | | | 0,14 | 10 |
| | | | | | | | Spinat | 5 | 3 | | | 0,29 | 25 |
| Mandipropamid | UDL | 940 | 929 | 10 | | 1 | Bladbede | 1 | 1 | | | 0,015 | 25 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 1 | | | 0,007 | 2,6 |
| | | | | | | | Ruccola | 4 | 2 | | | 0,017 | 25 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 3 | | | 3,9 | 25 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,22 | 25 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | | | 1 | 0,99 | 0,05 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,013 | 2 |
| Mepanipyrim | UDL | 914 | 909 | 5 | | | Jordbær | 28 | 5 | | | 0,31 | 3 |
| Mepiquatchlorid | DK | 82 | 81 | 1 | | | Speltmel | 1 | 1 | | | 0,029 | 3 |
| Metalaxyl | UDL | 940 | 920 | 20 | | | Bordvin, hvidvin | 10 | 1 | | | 0,005 | 1,3 |
| | | | | | | | Bordvin, rødvin | 33 | 12 | | | 0,071 | 1,3 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,011 | 3 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 6 | | | 0,72 | 2 |
| Methiocarb (sum) | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Purløg | 5 | 1 | | | 0,029 | 1 |
| Metrafenon | DK | 329 | 328 | 1 | | | Tomat | 19 | 1 | | | 0,016 | 0,6 |
| Metrafenon | UDL | 940 | 933 | 6 | | 1 | Chili | 14 | 2 | | | 0,14 | 2 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,051 | 0,6 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | | | 1 | 1,1 | 0,05 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 3 | | | 0,16 | 7 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Myclobutanil | UDL | 865 | 852 | 13 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 3 | | | 0,16 | 2 |
| | | | | | | | Figen, frisk | 8 | 1 | | | 0,005 | 0,02 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 2 | | | 0,022 | 0,5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,049 | 0,5 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,046 | 0,3 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,017 | 1 |
| Omethoat | UDL | 940 | 939 | | | 1 | Ærter med bælg | 11 | | | 1 | 0,015 | 0,01 |
| Penconazol | UDL | 880 | 867 | 13 | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,009 | 0,15 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 4 | | | 0,033 | 0,5 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 1 | | | 0,018 | 0,15 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 7 | | | 0,087 | 0,5 |
| Pencycuron | DK | 329 | 326 | 3 | | | Kartoffel | 26 | 1 | | | 0,011 | 0,1 |
| | | | | | | | Kartoffel, ny | 7 | 2 | | | 0,017 | 0,1 |
| Permethrin (sum) | UDL | 935 | 934 | | 1 | | Ris | 19 | | 1 | | 0,026 | 0,05 |
| Phenmedipham | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,014 | 0,3 |
| Phosmet (sum) | UDL | 839 | 834 | 5 | | | Appelsin | 43 | 1 | | | 0,073 | 0,5 |
| | | | | | | | Blomme | 17 | 1 | | | 0,007 | 0,6 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 2 | | | 0,018 | 0,5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,012 | 0,5 |
| Piperonylbutoxid | DK | 308 | 303 | 5 | | | Havrekerner | 5 | 2 | | | 0,025 | 0 |
| | | | | | | | Hvedekerner | 14 | 3 | | | 0,02 | 0 |
| Piperonylbutoxid | UDL | 914 | 898 | 16 | | | Bygkerner | 2 | 1 | | | 0,04 | 0 |
| | | | | | | | Cornflakes | 4 | 2 | | | 0,059 | 0 |
| | | | | | | | Hvedekerner | 4 | 1 | | | 0,028 | 0 |
| | | | | | | | Pasta, tørret | 9 | 5 | | | 0,079 | 0 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,081 | 0 |
| | | | | | | | Ris | 18 | 4 | | | 6 | 0 |
| | | | | | | | Ris, grødris | 2 | 1 | | | 0,013 | 0 |
| | | | | | | | Speltmel | 3 | 1 | | | 0,013 | 0 |
| Pirimicarb | DK | 326 | 325 | 1 | | | Bladbede | 2 | 1 | | | 0,028 | 1,5 |
| Pirimicarb | UDL | 940 | 932 | 8 | | | Jordbær | 28 | 4 | | | 0,31 | 1,5 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 3 | | | 0,068 | 0,5 |
| Pirimiphos-methyl | UDL | 1010 | 1003 | 7 | | | Cornflakes | 6 | 1 | | | 0,015 | 0,5 |
| | | | | | | | Hvedekerner | 6 | 1 | | | 0,013 | 5 |
| | | | | | | | Pasta, tørret | 11 | 5 | | | 0,093 | 5 |
| Prochloraz (sum) | UDL | 941 | 940 | 1 | | | Appelsin | 43 | 1 | | | 1,1 | 10 |
| Propamocarb | DK | 326 | 318 | 8 | | | Agurk | 15 | 6 | | | 0,063 | 5 |
| | | | | | | | Kartoffel | 26 | 2 | | | 0,011 | 0,3 |
| Propamocarb | UDL | 940 | 893 | 46 | 1 | | Agurk | 25 | 19 | | | 2,1 | 5 |
| | | | | | | | Broccoli | 1 | 1 | | | 0,01 | 3 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 3 | | | 0,018 | 3 |
| | | | | | | | Kartoffel | 14 | 2 | | | 0,016 | 0,3 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 2 | | | 0,039 | 5 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 8 | | | 0,094 | 3 |
| | | | | | | | Radise | 10 | 5 | 1 | | 1,7 | 3 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,23 | 30 |
| | | | | | | | Salat, iceberg | 9 | 2 | | | 0,008 | 40 |
| | | | | | | | Spidskål | 3 | 1 | | | 0,008 | 0,7 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 12 | 40 |
| | | | | | | | Vandmelon | 5 | 1 | | | 0,013 | 5 |
| Propargit | UDL | 880 | 879 | | | 1 | Jordbær | 28 | | | 1 | 0,018 | 0,01 |
| Propiconazol | UDL | 940 | 922 | 18 | | | Appelsin | 43 | 8 | | | 2,6 | 9 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 5 | | | 1,1 | 5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 5 | | | 0,92 | 5 |
| Proquinazid | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,011 | 0,5 |
| Prosulfocarb | DK | 329 | 328 | | | 1 | Bladbede | 2 | | | 1 | 0,013 | 0,01 |
| Prosulfocarb | UDL | 940 | 937 | 3 | | | Gulerod | 19 | 3 | | | 0,017 | 1 |
| Pyraclostrobin | DK | 329 | 308 | 20 | 1 | | Gulerod | 24 | 1 | | | 0,014 | 0,5 |
| | | | | | | | Jordbær | 17 | 3 | | | 0,008 | 1,5 |
| | | | | | | | Pak choi, rød | 1 | 1 | | | 0,006 | 1,5 |
| | | | | | | | Pære | 15 | 3 | | | 0,012 | 0,5 |
| | | | | | | | Rødbedeblade | 1 | 1 | | | 0,011 | 10 |
| | | | | | | | Salat | 3 | | 1 | | 1,7 | 2 |
| | | | | | | | Salat, iceberg | 4 | 1 | | | 0,019 | 2 |
| | | | | | | | Æble | 22 | 9 | | | 0,064 | 0,5 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 10 | 1 | | | 0,011 | 0,6 |
| Pyraclostrobin | UDL | 940 | 890 | 48 | | 2 | Appelsin | 43 | 3 | | | 0,12 | 2 |
| | | | | | | | Blomme | 17 | 3 | | | 0,022 | 0,8 |
| | | | | | | | Brombær | 3 | 2 | | | 0,026 | 3 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 3 | | | 0,024 | 2 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,01 | 0,3 |
| | | | | | | | Hindbær | 2 | 1 | | | 0,005 | 3 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 7 | | | 0,11 | 1,5 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 2 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 4 | | | 0,014 | 2 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 5 | | | 0,014 | 0,3 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,068 | 0,5 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 8 | | | 0,057 | 0,5 |
| | | | | | | | Ruccola | 4 | 1 | | | 0,22 | 10 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | 1 | 2,2 | 2 |
| | | | | | | | Spinat | 10 | 1 | | | 0,03 | 0,6 |
| | | | | | | | Te, urte | 1 | | | 1 | 0,19 | 0,1 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 2 | | | 0,031 | 0,3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,036 | 0,5 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,006 | 0,6 |
| Pyridaben | UDL | 940 | 938 | | | 2 | Chili | 14 | | | 1 | 0,037 | 0,01 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | | | 1 | 0,062 | 0,01 |
| Pyrimethanil | DK | 326 | 323 | 3 | | | Jordbær | 17 | 3 | | | 0,34 | 5 |
| Pyrimethanil | UDL | 940 | 887 | 53 | | | Appelsin | 43 | 19 | | | 2,1 | 8 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 6 | | | 2,5 | 8 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,17 | 5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 17 | | | 2,4 | 8 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 4 | | | 1,9 | 15 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,19 | 5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 5 | | | 4,1 | 15 |
| Pyriproxyfen | UDL | 940 | 903 | 36 | | 1 | Appelsin | 43 | 16 | | | 0,044 | 0,6 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 2 | | | 0,09 | 0,7 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 2 | | | 0,19 | 1 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 4 | | | 0,042 | 0,6 |
| | | | | | | | Granatæble | 18 | 1 | | | 0,006 | 0,05 |
| | | | | | | | Kvæde | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,2 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 1 | | | 0,007 | 0,6 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 7 | | | 0,059 | 0,6 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | | | 1 | 0,23 | 0,05 |
| | | | | | | | Te | 17 | 1 | | | 0,027 | 15 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,01 | 1 |
| Spinosad (sum) | DK | 308 | 304 | 4 | | | Jordbær | 17 | 4 | | | 0,019 | 0,3 |
| Spinosad (sum) | UDL | 914 | 885 | 29 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,009 | 0,3 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 4 | | | 0,06 | 0,6 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 3 | | | 0,018 | 0,3 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 1,3 | 15 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 5 | | | 0,013 | 0,6 |
| | | | | | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,037 | 2 |
| | | | | | | | Persille (økologisk) | 1 | 1 | | | 0,014 | 60 |
| | | | | | | | Persille, bredbladet (økologisk) | 1 | 1 | | | 0,34 | 60 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | 2 | | | 0,38 | 15 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 1 | | | 0,006 | 0,3 |
| | | | | | | | Ruccola | 4 | 1 | | | 0,028 | 10 |
| | | | | | | | Salat (økologisk) | 2 | 1 | | | 0,12 | 10 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 2 | | | 0,16 | 10 |
| | | | | | | | Tomat (økologisk) | 5 | 1 | | | 0,03 | 0,7 |
| | | | | | | | Vindrue (økologisk) | 6 | 1 | | | 0,009 | 0,5 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,016 | 0,5 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,051 | 0,3 |
| Spirodiclofen | UDL | 646 | 644 | 2 | | | Æble | 25 | 2 | | | 0,031 | 0,8 |
| Spiromesifen | UDL | 940 | 938 | 2 | | | Peberfrugt | 48 | 2 | | | 0,11 | 0,5 |
| Spiroxamin | UDL | 940 | 938 | 2 | | | Vindrue | 40 | 2 | | | 0,026 | 0,6 |
| Tebuconazol | DK | 326 | 324 | 2 | | | Havrekerner | 5 | 2 | | | 0,014 | 2 |
| Tebuconazol | UDL | 865 | 826 | 38 | 1 | | Blomme | 17 | 5 | 1 | | 0,089 | 0.01-1 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 5 | | | 0,098 | 0,6 |
| | | | | | | | Hvedekerner | 6 | 1 | | | 0,011 | 0,3 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 7 | | | 0,15 | 5 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 10 | | | 0,098 | 0,6 |
| | | | | | | | Purløg | 4 | 1 | | | 0,018 | 2 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 2 | | | 0,018 | 0,3 |
| | | | | | | | Ris | 19 | 3 | | | 0,052 | 0.75-1.5 |
| | | | | | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,01 | 0,9 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,006 | 0,5 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,017 | 0,3 |
| | | | | | | | Ærter med bælg | 11 | 1 | | | 0,02 | 2 |
| Tebufenozid | UDL | 940 | 936 | 3 | | 1 | Bordvin, rødvin | 33 | 1 | | | 0,011 | 5,2 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | | | 1 | 0,041 | 0,01 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 1 | | | 0,015 | 1 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,029 | 1 |
| Tebufenpyrad | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Tomat | 24 | 1 | | | 0,33 | 0,8 |
| Tetraconazol | UDL | 880 | 879 | 1 | | | Ribs | 1 | 1 | | | 0,012 | 0,2 |
| Thiabendazol | UDL | 940 | 888 | 51 | 1 | | Appelsin | 43 | 22 | 1 | | 5,9 | 7 |
| | | | | | | | Banan | 14 | 7 | | | 0,32 | 6 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 6 | | | 1,6 | 7 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 3 | | | 0,15 | 7 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 11 | | | 3,1 | 7 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 1 | | | 0,34 | 4 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,007 | 0,3 |
| Thiacloprid | DK | 329 | 323 | 6 | | | Honning | 29 | 3 | | | 0,059 | 0,2 |
| | | | | | | | Jordbær | 17 | 3 | | | 0,035 | 1 |
| Thiacloprid | UDL | 940 | 921 | 18 | | 1 | Abrikos, tørret | 1 | 1 | | | 0,006 | 1,7 |
| | | | | | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,013 | 0,5 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,005 | 1 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,053 | 1 |
| | | | | | | | Jordbær, tørret | 1 | 1 | | | 0,075 | 1 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,3 | 5 |
| | | | | | | | Lime | 18 | | | 1 | 0,068 | 0,01 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,011 | 0,2 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 2 | | | 0,085 | 0,5 |
| | | | | | | | Persille, bredbladet | 1 | 1 | | | 0,024 | 5 |
| | | | | | | | Pære | 23 | 3 | | | 0,016 | 0,3 |
| | | | | | | | Ribs | 1 | 1 | | | 0,017 | 1 |
| | | | | | | | Selleri | 7 | 1 | | | 0,007 | 0,05 |
| | | | | | | | Te | 17 | 1 | | | 0,046 | 10 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 1 | | | 0,013 | 0,3 |
| Thiamethoxam | UDL | 940 | 930 | 5 | 2 | 3 | Bønne, kidney | 3 | | 1 | | 0,026 | 0,04 |
| | | | | | | | Chili | 14 | 1 | | | 0,054 | 0,7 |
| | | | | | | | Kørvel | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,02 |
| | | | | | | | Melon | 16 | 1 | | | 0,012 | 0,15 |
| | | | | | | | Purløg | 5 | | | 3 | 6,3 | 0,02 |
| | | | | | | | Salat | 10 | | 1 | | 0,008 | 0,01 |
| | | | | | | | Te | 17 | 2 | | | 0,11 | 20 |
| Thiophanat-methyl | UDL | 940 | 937 | 3 | | | Citron | 17 | 1 | | | 0,011 | 6 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 1 | | | 0,019 | 0,1 |
| | | | | | | | Salat | 10 | 1 | | | 0,013 | 0,1 |
| Tolclofos-methyl | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Radise | 10 | 1 | | | 0,028 | 0,1 |
| Triadimenol | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Peberfrugt | 48 | 1 | | | 0,039 | 0,1 |
| Triazophos | UDL | 995 | 994 | | 1 | | Ris | 19 | | 1 | | 0,02 | 0,02 |

| Påvist stof | Oprindelse | (pr. stof og oprindelse) | | | | | Produkt | (pr. stof, oprindelse og produkt) | | | | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal prøver | | Antal fund af stof | | | | | Antal fund af stof | | | | |
| | | Antal prøver analyseret | Stof ikke påvist | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | | Antal prøver analyseret | Ikke over 50% af MRL | 51-100% af MRL | Over MRL | Højeste indhold (mg/kg) | |
| Tricyclazol | UDL | 940 | 939 | | | 1 | Ris | 19 | | | 1 | 0,013 | 0,005 |
| Trifloxystrobin | UDL | 865 | 829 | 36 | | | Appelsin | 43 | 2 | | | 0,025 | 0,5 |
| | | | | | | | Bønner med bælg | 15 | 1 | | | 0,014 | 1 |
| | | | | | | | Citron | 17 | 2 | | | 0,01 | 0,5 |
| | | | | | | | Fersken | 14 | 1 | | | 0,03 | 3 |
| | | | | | | | Jordbær | 28 | 14 | | | 0,13 | 1 |
| | | | | | | | Jordbær, tørret | 1 | 1 | | | 0,067 | 1 |
| | | | | | | | Lime | 18 | 3 | | | 0,042 | 0,5 |
| | | | | | | | Mandarin, clementin | 36 | 1 | | | 0,005 | 0,5 |
| | | | | | | | Nektarin | 23 | 3 | | | 0,047 | 3 |
| | | | | | | | Ribs | 1 | 1 | | | 0,005 | 3 |
| | | | | | | | Vindrue | 40 | 4 | | | 0,32 | 3 |
| | | | | | | | Æble | 28 | 3 | | | 0,03 | 0,7 |
| Triflumizol (sum) | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Agurk | 25 | 1 | | | 0,007 | 0,5 |
| Triflumuron | UDL | 940 | 939 | 1 | | | Æble, tørret | 1 | 1 | | | 0,008 | 0,5 |
| Zoxamid | UDL | 914 | 913 | 1 | | | Vindrue | 40 | 1 | | | 0,011 | 5 |

# Bilag 4

## Påviste overtrædelser, 2020

Tabellerne indeholder foruden prøver med indhold over maksimalgrænseværdien (MRL) også økologiske prøver med påviste indhold, hvis de er vurderet at være en overtrædelse af økologireglerne samt anpriste prøver med indhold af stråforkortere.

Desuden inkluderer bilaget prøver med påvisning af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl, hvor det er vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes, selvom MRL ikke er overskredet.

**Frugt, grøntsager, korn o.lign. (frisk og dybfrost, konventionelt dyrkede) (1026 udtagne prøver) – Stikprøver**

| Produkt | Produceret i | Stof | Analyse-resultat (mg/kg) | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Appelsin | Egypten | Imazalil | 5,6 | | 5 |
| Bladbede | Danmark | Prosulfocarb | 0,013 | | 0,01 |
| Blomme | Italien | Etofenprox | 0,057 | a) | 0,01 |
| Bønne, tørret | Madagaskar | Chlorpyrifos | 0,061 | a)b) | 0,01 |
| Chili 1) | Tyrkiet | Buprofezin | 0,02 | a)b) | 0,01 |
| Chili 1) | Tyrkiet | Clothianidin | 0,02 | | 0,04 |
| Chili 1) | Tyrkiet | Pyridaben | 0,037 | a) | 0,01 |
| Granatæble | Egypten | Acetamiprid | 0,011 | | 0,01 |
| Jordbær | Egypten | Propargit | 0,018 | | 0,01 |
| Lime | Brasilien | Thiacloprid | 0,068 | a) | 0,01 |
| Lime | Brasilien | Bifenthrin | 0,059 | | 0,05 |
| Melon | Brasilien | Etofenprox | 0,016 | | 0,01 |
| Peberfrugt | Tyrkiet | Pyridaben | 0,062 | a) | 0,01 |
| Peberfrugt | Tyrkiet | Buprofezin | 0,021 | a)b) | 0,01 |
| Purløg | Jordan | Thiamethoxam | 0,097 | a) | 0,02 |
| Purløg 2) | Kenya | Pyriproxyfen | 0,23 | a) | 0,05 |
| Purløg 2) | Kenya | Tebufenozid | 0,041 | a) | 0,01 |
| Purløg | Kenya | Thiamethoxam | 6,3 | a) | 0,02 |
| Purløg 3) | Tanzania | Cyhalothrin, lambda- | 1,8 | a) | 0,7 |
| Purløg 3) | Tanzania | Thiamethoxam | 3,2 | a) | 0,02 |
| Salat | Italien | Pyraclostrobin | 2,2 | | 2 |
| Te, urte 4) | Land ikke oplyst | Ametoctradin | 0,4 | a) | 0,01 |
| Te, urte 4) | Land ikke oplyst | Dimethomorph | 0,37 | a) | 0,05 |
| Te, urte 4) | Land ikke oplyst | Mandipropamid | 0,99 | a) | 0,05 |
| Te, urte 4) | Land ikke oplyst | Metrafenon | 1,1 | a) | 0,05 |
| Te, urte 4) | Land ikke oplyst | Pyraclostrobin | 0,19 | | 0,1 |
| Vindrue | Egypten | Chlorpyrifos | 0,027 | a)b) | 0,01 |
| Ærter med bælg | Guatemala | Omethoat | 0,015 | | 0,01 |
| Ærter med bælg | Peru | Carbendazim og benomyl | 1 | a)b) | 0,2 |
| Ris 5) | Land ikke oplyst | Buprofezin | 0,014 | a)b) | 0,005 |
| Ris 5) | Land ikke oplyst | Tricyclazol | 0,013 | a)b) | 0,005 |
| Ris 6) | Pakistan | Acetamiprid | 0,017 | | 0,01 |
| Ris 6) | Pakistan | Carbendazim og benomyl | 0,028 | a)b) | 0,01 |

| | |
|---|---|
| Antal prøver med overskridelser: | 28 |
| Antal signifikante overskridelser: | 22 |
| Antal prøver med signifikante overskridelser: | 15 |
| Antal prøver med sundhedsmæssig risiko, jf. b) | 7 |

a) MRL er signifikant overskredet
b) Vurderes at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller en sundhedsmæssig risiko kan ikke udelukkes

1), 2), 3), 4),5) og 6): Samme prøve

**Frugt, grøntsager, korn o.lign. (frisk og dybfrost, konventionelt dyrkede) (1026 udtagne prøver) – Udtaget som stikprøver. Prøver med indhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl under MRL**

| Produkt | Produceret i | Stof | Analyse-resultat (mg/kg) | | MRL (mg/k) |
|---|---|---|---|---|---|
| Appelsin | Grækenland | Chlorpyrifos | 0,024 | a) | 1,5 |
| Banan | Ecuador | Chlorpyrifos | 0,023 | a) | 4 |
| Citron | Egypten | Chlorpyrifos | 0,035 | a) | 1,5 |
| Mandarin, clementin | Marokko | Chlorpyrifos | 0,034 | a) | 1,5 |
| Mandarin, clementin | Spanien | Chlorpyrifos-methyl | 0,028 | a) | 2 |

a) Resultatet overskrider ikke maksimalgrænseværdier, men det påviste indhold er vurderet til, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

**Mistankeprøver, målrettet prøvetagning og kampagne (180 prøver)**

| Produkt | Produceret i | Stof | Analysere-sultat (mg/kg) | | MRL (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine 7) | EU-Lande | Dimethoat | 0,044 | a)b) | 0,01 |
| Aubergine 7) | EU-Lande | Omethoat | 0,027 | a)b) | 0,01 |
| Aubergine 8) | Thailand | Acephat | 0,032 | a) | 0,01 |
| Aubergine 8) | Thailand | Ethion | 0,07 | a) | 0,01 |
| Aubergine 8) | Thailand | Omethoat | 0,12 | a)b) | 0,01 |
| Aubergine | Tyrkiet | Omethoat | 0,015 | b) | 0,01 |
| Bitteragurk 9) | Vietnam | Metalaxyl | 0,028 | a) | 0,01 |
| Bitteragurk 9) | Vietnam | Profenofos | 0,028 | a) | 0,01 |
| Bønne, mung 10) | Thailand | Hexaconazol | 0,016 | | 0,01 |
| Bønne, mung 10) | Thailand | Triazophos | 0,027 | a) | 0,01 |
| Daddel 11) | Egypten | Carbendazim og benomyl | 1,1 | a)b) | 0,1 |
| Daddel 11) | Egypten | Propamocarb | 0,36 | a) | 0,01 |
| Daddel 11) | Egypten | Thiophanat-methyl | 0,33 | a | 0,1 |
| Dild 12) | Thailand | Cyproconazol | 0,12 | a) | 0,05 |
| Dild 12) | Thailand | Profenofos | 0,088 | | 0,05 |
| Dild 12) | Thailand | Propiconazol | 0,44 | a) | 0,02 |
| Dild 13) | Thailand | Carbofuran (sum) | 0,048 | a)b) | 0,02 |
| Dild 13) | Thailand | Chlorpyrifos | 0,2 | a)b) | 0,01 |
| Dragefrugt 14) | Thailand | Fluxapyroxad | 0,014 | | 0,01 |
| Dragefrugt 14) | Thailand | Iprodion | 0,11 | a) | 0,01 |
| Dragefrugt 14) | Thailand | Pyraclostrobin | 0,027 | | 0,02 |

| Mistankeprøver, målrettet prøvetagning og kampagne (180 prøver) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Produceret i | Stof | Analysere-sultat (mg/kg) | MRL (mg/kg) |
| Hellig Basilikum | Thailand | Chlorpyrifos | 0,12 a)b) | 0,02 |
| Jordbær | Egypten | Chlorpropham | 0,018 | 0,01 |
| Koriander, frisk | Thailand | Mepanipyrim | 0,025 | 0,02 |
| Koriander, frisk | Thailand | Chlorpyrifos | 0,011 b) | 0,01 |
| Limeblade | Thailand | Chlorpyrifos | 0,034 b) | 0,02 |
| Meterbønne 15) | Thailand | Acephat | 0,074 a) | 0,01 |
| Meterbønne 15) | Thailand | Methamidophos | 0,011 | 0,01 |
| Pære | Tyrkiet | Diflubenzuron | 0,011 b) | 0,01 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Bifenthrin | 0,024 | 0,02 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Chlorfenapyr | 1 a) | 0,02 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Chlorpyrifos | 0,031 b) | 0,02 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Omethoat | 2,4 a)b) | 0,02 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Quintozen (sum) | 3,2 a)b) | 0,05 |
| Selleriblade 16) | Thailand | Tecnazen | 0,031 b) | 0,02 |
| Skruepalme 17) | Thailand | Chlorfenapyr | 0,61 a) | 0,02 |
| Skruepalme 17) | Thailand | Pyridaben | 0,46 a) | 0,02 |
| Svampe, dyrkede 18) | Vietnam | Chlorpyrifos | 0,046 a)b) | 0,01 |
| Svampe, dyrkede 18) | Vietnam | Dimethoat | 0,043 a)b) | 0,01 |
| Sød Basilikum 19) | Thailand | Carbendazim og benomyl | 0,4 a)b) | 0,1 |
| Sød Basilikum 19) | Thailand | Pyridaben | 0,073 a) | 0,02 |
| Sød Basilikum 19) | Thailand | Triazophos | 1,5 a)b) | 0,01 |
| Sød Basilikum | Thailand | Chlorpyrifos | 0,44 a)b) | 0,02 |
| Ris 20) | Indien | Profenofos | 0,015 | 0,01 |
| Ris 20) | Indien | Thiamethoxam | 0,033 a) | 0,01 |
| Ris 20) | Indien | Tricyclazol | 0,081 a)b) | 0,01 |
| Ris 21) | Indien | Buprofezin | 0,021 a)b) | 0,01 |
| Ris 21) | Indien | Thiamethoxam | 0,019 | 0,01 |
| Ris 21) | Indien | Tricyclazol | 0,087 a)b) | 0,01 |
| Ris | Pakistan | Acetamiprid | 0,011 | 0,01 |
| Ris | Pakistan | Acetamiprid | 0,013 | 0,01 |
| Ris 22) | Pakistan | Acetamiprid | 0,016 | 0,01 |
| Ris 22) | Pakistan | Carbendazim og benomyl | 0,034 a)b) | 0,01 |
| Ris 22) | Pakistan | Thiamethoxam | 0,012 | 0,01 |
| Ris 22) | Pakistan | Triazophos | 0,027 | 0,02 |
| Ris 23) | Pakistan | Carbendazim og benomyl | 0,04 a)b) | 0,01 |
| Ris 23) | Pakistan | Tricyclazol | 0,012 b) | 0,01 |
| Ris, brune | Sri Lanka | Profenofos | 0,019 | 0,01 |
| Bukkehornsblade, tørret 24) | Indien | Chlorpyrifos | 0,79 a)b) | 0,2 |
| Bukkehornsblade, tørret 24) | Indien | Tricyclazol | 0,026 b) | 0,2 |
| Antal prøver med overskridelser: | | | | 29 |
| Antal signifikante overskridelser: | | | | 36 |

| **Mistankeprøver, målrettet prøvetagning og kampagne (180 prøver)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Produceret i | Stof | Analysere-sultat (mg/kg) | MRL (mg/kg) |
| Antal prøver med signifikante overskridelser: | | | | 20 |
| Antal prøver med sundhedsmæssig risiko, jf b) | | | | 18 |

a) MRL er signifikant overskredet

b) Vurderes at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller at en sundhedsmæssig risiko kan ikke udelukkes

7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24): Samme prøve

# Bilag 5

# Fund af flere pesticider i samme prøve, 2020

Bilaget angiver antallet af stikprøver og mistankeprøver, hvor der er fundet mere end ét pesticid i samme prøve, fordelt på prøver af dansk og udenlandsk oprindelse. Der blev fundet mere end 1 pesticid i samme prøve blandt prøver af frugt, grøntsager, cerealier og forarbejdede vegetabilske fødevarer.

| **Frugt, grøntsager, cerealier og babymad (frisk, dybfrost, inkl. økologiske og forarbejdede varer) (1248 udtagne prøver, heraf 307 danske, 598 fra EU og 343 udenfor EU) – stikprøver** | | | |
|---|---|---|---|
| Antal pesticider i samme prøve | Antal prøver med dansk oprindelse | Antal prøver med oprindelse fra andre EU lande | Antal prøver med oprindelse udenfor EU |
| 2 | 28 | 91 | 47 |
| 3 | 9 | 55 | 36 |
| 4 | 9 | 50 | 19 |
| 5 | | 24 | 16 |
| 6 | | 9 | 9 |
| 7 | | 4 | 8 |
| 8 | | 2 | 5 |
| 9 | | | 2 |
| 10 | | | 1 |
| 11 | | | 1 |
| 12 | | | 1 |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| Sum | 46 | 235 | 145 |
| % | 15,0 | 39,3 | 42,2 |

| | **Kun National- og EU-koordineret mistankekontrol. Frugt, grøntsager og cerealier. (frisk, dybfrost, inkl. økologiske). (217 udtagne prøver, heraf 2 fra EU og 215 uden for EU)** | |
|---|---|---|
| Antal pesticider i samme prøve | Antal prøver med oprindelse fra andre EU lande | Antal prøver med oprindelse udenfor EU |
| 2 | | 11 |
| 3 | | 15 |
| 4 | 1 | 11 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 1 |
| 7 | | 2 |
| 8 | | 3 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | 1 |
| 14 | | |
| 15 | | |
| Sum | 1 | 50 |
| % | 50% | 23,3 |

# Bilag 6

# Definitioner

**ADI: Acceptabelt dagligt indtag**
Det acceptable daglige indtag (udtrykt i mg/kg legemsvægt/dag) er defineret som den mængde pesticid, et menneske kan indtage dagligt gennem et helt liv uden en sundhedsmæssig risiko. ADI fastsættes på grundlag af den samlede viden om stoffets uønskede effekter, der for en stor dels vedkommende stammer fra dyreeksperimentelle undersøgelser. Ud fra undersøgelserne vurderes den højeste dosis, der ikke giver påviselige skadelige effekter i den mest følsomme dyreart, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). ADI beregnes ved at dividere NOAEL med en usikkerhedsfaktor på normalt 100. Det er værd at bemærke, at ADI ikke er en grænseværdi, men et udtryk for den mængde en forbruger med stor sikkerhed dagligt kan indtage hele livet igennem uden en sundhedsmæssig risiko. For pesticider fastsættes ADI af EFSA.

**ARfD: Akut reference dosis**
Nogle pesticider kan have en akut virkning dvs. medføre uønskede effekter kort tid efter indtagelse. En akut reference dosis (ARfD) er den mængde af et pesticid, som kan indtages over en kort periode, normalt en dag, uden en akut sundhedsmæssig risiko for forbrugeren. ARfD er fastsat ud fra vurdering af et akut NOAEL, som regel ud fra dyreeksperimentelle undersøgelser, og tilsvarende som for ADI, er der brugt en usikkerhedsfaktor.

**Hazard Index**
Hazard Index er et mål for den samlede eksponering for pesticider fra en prøve med indhold af flere pesticider. Eksponeringen for hvert stof vægtes i forhold til stoffets ADI: For hvert stof beregnes eksponeringen som produktet af det skønnede forbrug af den pågældende afgrøde (pr. dag og pr. kg legemsvægt) og det målte pesticidindhold i prøven. Hazard Index beregnes som summen af forholdet mellem ekpsonering af hvert stof og dets ADI eller ARfD. Hvis summen er over 1 anses indholdet i prøven for at være uacceptabel. Metoden forudsætter desuden, at stofferne har en additiv effekt.

**MRL: Maksimalgrænseværdi**
Maksimalgrænseværdier (MRL) for pesticidrester angiver den restmængde af et pesticid, der må være i en given fødevare – målt som mg pesticid pr kg fødevare. Fastsættelse af MRL for pesticidrester er i EU reguleret ved forordning 396/2005 [2]. Der findes fælles EU-MRL'er for hver kombination af pesticid og fødevare. For pesticid-afgrøde-kombinationer, hvor der ikke er en godkendt anvendelse af pesticidet, sættes MRL til EUs forventede bestemmelsesgrænse (stjernemærket MRL; også kaldet detektionsgrænsen), normalt på 0,01 mg/kg.

**Rapid alert**
Hvis ARfD eller ADI overskrides, indberetter Fødevarestyrelsen dette til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). RASFF skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne i EU.

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Tlf.: 72 27 69 00

Kontakt: www.fvst.dk/kontakt
http://www.fvst.dk

ISBN 978-87-93147-46-1